

# Potilaan varoituskortti

Pidä tämä kortti aina mukanasasi ja näytä se aina jokaiselle tapaamallesi lääkärille, hoitajalle tai apteekkihenkilökunnalle.

## Tärkeää turvallisuustietoa Forxigasta (dapagliflotsiini) – koskee vain tyyppin 1 diabetesta

### **Diabeettisen ketoasidoosin oireita ovat:**

**Suu ja vatsa:** Huonovointisuus tai yleinen sairauden tunne, mahakipu, voimakas jano/suun kuivuus (elimistön kuivumisen oireita), makea tai metallinen maku suussasi.

**Hengitys, hengittäminen ja haju:** Nopea ja syvä hengittäminen, makealta tuoksuva hengitys, muutos virtsan tai hien hajussa.

**Muita oireita:** Veren tai virtsan kohonnut ketoainepitoisuus, nopea painonlasku, sekavuus, epätavallinen uneliaisuus tai väsymys.

**Jos sinulla on diabeettisen ketoasidoosin oireita, ota välittömästi yhteyttä lääkäriin tai sairaalaan ja lopeta heti Forxigan käyttö.**

### **Muista:**

Potilailla, jotka käyttävät Forxigaa, voi ilmaantua diabeettinen ketoasidoosi, vaikka verensokeritaso olisi alle 14 mmol/l (250 mg/dl). Tätä kutsutaan nimellä euglykeeminen diabeettinen ketoasidoosi.

## Sinun ja lääkärisi yhteystiedot



Nimesi:

---

Lääkärisi nimi:

---

Lääkärin puhelinnumero:

---

Forxiga-hoidon aloituspäivämäärä:

---

Omainen tai ystävä, johon tulee olla yhteydessä hätätilanteessa:

---

Omaisien tai ystävien puhelinnumero:

---



**Tämä potilas käyttää Forxigaa (dapagliflotsiini) tyypin 1 diabetes mellituksen hoitoon.**

- Sitä käytetään insuliinihoidon lisänä.
- Se on tyypiltään SGLT2-estäjä.

Lopeta Forxiga-hoito tilapäisesti ennen leikkaustoimenpiteitä tai sairaalahoitoon johtavan vakavan akuutin sairastumisen vuoksi.

**Arvioi potilaan diabeettisen ketoasidoosin (DKA) mahdollisuus välittömästi, jos hänellä on diabeettisen ketoasidoosin oireita**

- Arvioi diabeettisen ketoasidoosin mahdollisuus riippumatta potilaan verensokeripitoisuudesta.
- Potilailla, jotka käyttävät Forxigaa, diabeettinen ketoasidoosi voi ilmaantua, vaikka verensokeritaso olisi alle 14 mmol/l (250 mg/dl). Tätä kutsutaan nimellä euglykeeminen diabeettinen ketoasidoosi.

**Diabeettisen ketoasidoosin hoitaminen**

- **Jos epäilet diabeettista ketoasidoosia:** saata potilas välittömästi lääkärin hoitoon ja lopeta Forxiga-hoito heti.
- **Euglykeemisen diabeettisen ketoasidoosin hoito vaatii:**

lisähiilihydraatteja insuliinin ja nesteiden lisänä

**Älä lopeta tai keskeytä insuliinihoitoa missään tilanteessa.**

Jos sinulla on haittavaikutuksia, kerro niistä apteekkihenkilökunnalle, lääkärillesi tai hoitajallesi. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu pakkausselosteessa.

Voit ilmoittaa haittavaikutuksista:

Fimeaan

Lääkealan turvallisuus- ja

kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 FIMEA

[www.fimea.fi](http://www.fimea.fi)

tai

suoraan myyntiluvan haltijalle

<https://aereporting.astrazeneca.com>

Haittavaikutusilmoitusta tehdessäsi, muista mainita, että sinulla on tyypin 1 diabetes.

Tämä materiaali, Potilaan ja omaisen

opas sekä pakkausseloste ovat

sähköisesti saatavilla verkkosivulta

[www.potilas-rmp.forxiga.fi](http://www.potilas-rmp.forxiga.fi)