

VIKTIGT
INNEHÅLLER MEDICINSK
INFORMATION



▼ Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning.

Telefonkontakt:

Läkarens namn/klinikens eller sjukhusets namn:

Vid nödsituation eller om du hittar detta kort,
vänligen kontakta nedan angivna läkare:

PATIENTER behandlade med daratumumab: Ge detta kort till sjukvårdspersonalen FÖRE blodtransfusion och bär det i 6 månader efter att behandlingen har avslutats. För mer information, se bipacksedeln.

Patient-ID-kort för daratumumab

Namn: _____

Jag tar följande läkemedel:

antikroppsprodukten daratumumab för behandling av multipelt myelom.

Jag slutade ta detta läkemedel den ____ / ____ / ____
DD MM ÅÅÅÅ

Till hälso- och sjukvårdspersonal

Daratumumab är förknippad med risk för interferens med blodtypning. Ett indirekt Coombs test (indirekt antiglobulintest) kan ge positiva resultat hos patienter som tar daratumumab, även i frånvaro av antikroppar mot svaga blodantigener i patientens serum. Effekten kan kvarstå i upp till 6 månader efter den sista dosen. Bestämning av patientens ABO- och Rh-blodgrupp påverkas inte.

Om en akut transfusion blir nödvändig kan icke-korstestade ABO/RhD-kompatibla erythrocyter ges i enlighet med lokal blodcentralpraxis.

För mer information vänligen kontakta Janssens lokala medicinska informationsavdelning via e-post: jacfi@its.jnj.com eller telefon: 020 7531 300 (växel, be att få tala med "medicinsk information" och du kommer att bli kopplad till rätt person) eller använd denna referens för att få ytterligare information:

<http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/trf.13069/epdf>

Innan behandling med daratumumab påbörjades togs

blodprov den ____ / ____ / ____
DD MM ÅÅÅÅ

Mina resultat var:

Blodgrupp: A B AB O Rh+ Rh-

Indirekt Coombs test (antikropps-screening) var:

Negativt Positivt för följande antikroppar:

Övrigt: _____

Kontaktuppgifter till institutionen där blodproverna togs: _____