

# DUODOPA®-HOIDON MUISTILISTA

Tämä muistilista on tarkoitettu hoitohenkilökunnan avuksi potilaan Duodopa-hoidon suunnitteluun ja aloitukseen.

## HOIDON SUUNNITTELU

| Info   | Ilmoitus oman alueen AbbVien asiakkuusspesialistille   |
|--|--|
| Pyydä omainen/läheinen mukaan tapaamiseen.   | Kerro lääkkeen haittavaikutuksista.  |
| Kysy kotitilanne ja tiedustele avun tarve.   | Kerro Duodopan lääkekorvattavuudesta.  |
| Keskustele potilaan toimintakyvystä/sosiaalisesta elämästä/harrastuksista.   | Esittele Duodopa-laite/letkut/kantovälineet.   |
| Selvitä erityistyöntekijöiden tarve.   | Testaa, pystyykö potilas painamaan laitteen painikkeita.                                     |
| Kysy voimassa oleva Parkinson-lääkitys ja lääkkeiden ottoajat.   | Selvitä, kuka on laitteen ensisijainen käyttäjä.   |
| Selvitä vaikeimmat Parkinsonin taudin oireet. Tiedustele, miten hyvät ja huonot ajat jakautuvat ja millainen vointi on päivän ja yön aikana. | Kerro potilaan suostumuslomakkeesta.   |
| Kysy potilaalta yksi hoidon konkreettinen odotus ja kirjaa se ylös potilasasiakirjaan.   | Kerro varalaitteen sijainti.   |
| Esittele Duodopa-hoidon aloitusvaihtoehdot lyhyesti.   | Esittele potilaalle AbbVie Care (tukipuhelin, jatkohoitopaikkojen koulutus, Duo KotiSoitto). |
| Kerro voimassa olevan Parkinson-lääkityksen muuttamisesta Duodopa-hoidolle sopivaksi.  | Anna oman alueenne vertaistukihenkilön yhteystiedot.   |
| Kerro potilaalle kotiloman mahdollisuudesta / kotititrauksesta.  | Anna potilaalle Duodopa osana elämää -opas.  |
| Kerro lääkityksen mahdollisesta hyödystä/vaikutuksesta toimintakykyyn.   |  |

## Aikojen varaus, kun potilas on halukas hoidon aloitukseen

|  |   |
|--|---|
| Sovi aloitusajankohta AbbVien Duodopa-asiantuntijan kanssa.  | Varaa nenä-suoliletkun laittoaika.  |
| Ilmoita osastolle hoidon aloituksesta / tarkista henkilöresurssit / Duodopa-vastuuhoitajien työvuorot. | Tarkista, että potilaan Parkinson-lääkitys on muutettu sopivaksi Duodopa-hoidon aloitukselle. |
| Varaa PEG/J-toimenpideaika.  | Varaa ja ilmoita potilaalle osastolle tulopäivä.  |

## Tarvikkeiden tilaus; 2 viikkoa ennen Duodopa-hoidon aloitusta sähköisellä AbbVien tilauslomakkeella

|               |   |
|---------------|---|
| Laite         | Kirjallinen materiaali  |
| Letkut        | Hoidon aloituspaketti (sisältää kotiutuksessa annettavan materiaalin) |
| Kantovälineet | Lääkkeen aloituspakkauksen tilaaminen                                 |

## HOIDON ALOITUS

### Ennen hoidon aloitusta

|  |   |
|--|---|
| Tarkista, että Duodopa-lääkeasetit ovat osastolla.                         | Mittaa potilaan verenpaine ja tee ortostaattinen koe. |
| Tarkista, että Parkinson-lääkitys on Duodopa-hoidolle siirtymiseen sopiva. | Punnitse potilas.                                     |
| Huolehdi, että potilaan vatsa on toiminut.                                 | Laske Duodopa-lääkeannos.                             |

### Nenä-suoliletkun laitto

|   |  |
|---|--|
| Kerro potilaalle toimenpiteestä.  | Ota toimenpiteeseen mukaan 2 kpl AbbVie NJ-letkuja ja w/w-adapteria. |
| Huolehdi, että potilas on ravinnotta sairaalan ohjeiden mukaisesti (Parkinson-lääkkeet saa ottaa toimenpiteeseen asti). | Kerro potilaalle Duo KotiSoitto-palvelusta.                          |

## HOIDON ALOITUS

### Titraus nenä-suoliletkun aikana

|  |   |
|--|---|
| Ohjelmoi laitteeseen Duodopa-lääkeannokset.                          | Huomioi, että nenä-suoliletkua ja lisäletkua ei huuhdota. |
| Täytä lisäletku Esitäyttö-painikkeen avulla.                         | Laita lisäletku jääkappiin yöksi.                         |
| Täytä nenä-suoliletku (5 ml) lisäannoksella.                         | Tilaa Duodopa-lääkettä lisää osastolle.                   |
| Täytä tuntiseuranta kaaviota (ON/OFF-kaavio) ja titraa lääkeannosta. | Kotiloma.   |

### PEG/J-toimenpide

|   |  |
|---|--|
| Kerro potilaalle toimenpiteestä.                      | Huolehdi, että potilas on ravinnotta sairaalan ohjeiden mukaisesti.  |
| PEG-hoitajan käynti ennen ja jälkeen toimenpiteen.    | Anna potilaalle antibioottiprofylaksia, kipulääkitys.  |
| Ohjelmoi leikkausrutiinit, esilääkitys, kipulääkitys. | Ota toimenpiteeseen mukaan 2 kpl AbbVie PEG- ja sisäletkupakkauksia ja w/w-adaptteri.                            |
| Huolehdi, että potilaan vatsa on toiminut.            | Ota tarrat toimenpiteen yhteydessä PEG- ja sisäletkupakkauksista, kirjaa LOT- ja REF-numerot potilasasiakirjaan. |
| Muistuta potilasta suun hoidon tärkeydestä.           | Anna laitteen olla toiminnassa toimenpiteen alkuun asti.   |

### Titraus PEG/J-letkun aikana

|   |  |
|---|--|
| Täytä letku toimenpiteen jälkeen (3 ml) lisäannoksella.                           | Nosta aamuannos toimenpidettä seuraavana aamuna +3 ml. |
| Täytä tuntiseuranta kaaviota (ON/OFF) ja titraa lääkeannosta.                     | Hoida avanne päivittäin.                               |
| Huuhto sisäletku (2x20 ml) ja letkujen välitila (2x20 ml) haalealla juomavedellä. |  |

### Potilaan ja läheisen osattava ennen kotiutusta

|   |  |
|---|--|
| Paristojen asettaminen/vaihtaminen.   | Käy läpi laitteen ohjekirja/hälytykset.  |
| Lääkekasetin kiinnittäminen/irrottaminen.                                   | Laitteen vaihtaminen / varalaitteen sijainti.  |
| Lääkkeen säilytys.  | Eri kantovälineiden käyttäminen.   |
| Laitteen käynnistys/pysäytys.   | PEG/J-letkun hoito: sisäletkun ja letkujen välitilan huuhtominen.  |
| Aamuannoksen annosteleminen.  | Avanteen hoito.  |
| Lisäannoksen annosteleminen.  | Erityistilanteet ja mitä silloin tehdään: sisäletku tukossa / sisäletku tullut ulos / liittimet irti / PEG-letku poikki. |
| Annosmuutokset, jos neurologi on antanut potilaalle luvan muuttaa annoksia. |  |

## KOTIUTUS

|  |   |
|--|---|
| Ilmoita apteekkiin potilaan kotiutumispäivä lääkkeen tilaamista varten.  | Anna potilaalle lääkärin täyttämä englanninkielinen todistus matkustamista varten: Treatment Certificate.                                   |
| Informoi jatkohoitopaikkaa potilaan kotiutuksesta, kirjaa potilasasiakirjoihin.                                    | Anna potilaalle ruiskuja 20 ml, w/w-adapttereita, taitoksia, teippiä.   |
| Huolehdi, että jatkohoitopaikka on koulutettu/sovittu Duodopa-asiantuntijan kanssa ja kirjattu potilasasiakirjaan. | Anna Potilaan taskuopas ja Duodopa-käyttäjän opas. Tarkista, että Duodopa-käyttäjän oppaaseen on kirjattu yhteystiedot ja annosmuutosrajat. |
| Kirjaa potilasasiakirjaan laitteen ensisijainen käyttäjä.  | Anna riittävästi Duodopa-lääkettä mukaan.   |
| Tarkista, että potilas/läheinen osaa laitteen ja letkujen käsittelyn.  | Tarkista, että korvaava Parkinson-lääkitys on kirjattu potilasasiakirjoihin.  |
| Täytä hoitotarvikelomake.  | Varaa kontrolliajat.  |
| Vaihda paristot ja anna mukaan 2 kpl paristoja (AA 1,5 V).   |   |

## AbbVie Oy

Pihatörmä 1B, 02240 Espoo, Suomi  
FIDUO140614(2)/09.2018

Copyright © 2018 AbbVie. Kaikki oikeudet pidätetään.