

# AMGEVITA (adalimumabi)

## Potilaskortti

Tässä kortissa on tärkeitä turvallisuustietoja Amgevita-valmisteesta. Huom:

- Näytä tämä kortti aina, kun asioit lääkärin tai muun terveydenhuoltohenkilöstön kanssa, jotta he tietävät, että käytät Amgevita.
- Pidä tämä kortti aina mukanasini niin kauan kuin saat Amgevita-hoitoa ja myös viimeisen Amgevita-pistoksesi jälkeen.
- Kirjaa tämän kortin taakse tiedot mahdollisista tuberkuloosikokeista tai hoidoista.

On tärkeää muistaa, että tässä kortissa ei ole lueteltu kaikkia mahdollisia Amgevitan haittavaikutuksia. Lisätietoja saat Amgevitan pakkausselosteesta (lääkepakkausessa tai [www.laakeinfo.fi](http://www.laakeinfo.fi)) tai lääkäriltä.

▼ Tähän lääkkeeseen kohdistuu lisäseuranta. Tällä tavalla voidaan havaita nopeasti uutta turvallisuutta koskevaa tietoa. Voit auttaa ilmoittamalla kaikista mahdollisesti saamistasi haittavaikutuksista osoitteeseen Lääke-alan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea, Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri, PL 55, 00034 FIMEA ([www-sivusto: www.fimea.fi](http://www.sivusto: www.fimea.fi)).

**AMGEN**<sup>®</sup>

## Mitä Amgevita on?

Yleensä immuunijärjestelmä suojelee elimistöä infektioilta, mutta joissakin sairauksissa (autoimmuunisairauksissa) immuunijärjestelmä ei toimi normaalisti. Amgevita on lääke, jota käytetään tiettyjen autoimmuunisairauksien, kuten nivelreuman ja psoriaasin, hoidossa. Tämän kortin tarkoituksena on kertoa sinulle ja terveydenhoitohenkilökunnalle Amgevitän käyttöön liittyvistä turvallisuustekijöistä.

Mahdollisia Amgevitän käyttöön liittyviä haittavaikutuksia ovat:

- Infektiot
- Sydämen vajaatoiminta
- Syöpä
- Hermoston häiriöt.

Tässä ei ole lueteltu kaikkia Amgevitän mahdollisia haittavaikutuksia.

## Mitä minun pitäisi tietää ennen kuin aloitan Amgevita-hoidon?

Amgevita-hoidon hyödyt ja riskit voivat vaihdella potilaskohtaisesti. Keskustele hoitavan lääkärin kanssa Amgevitan hyödyistä ja riskeistä ennen hoidon aloittamista.

Kerro lääkärille ennen hoidon aloittamista:

- Mahdollisista sairauksistasi ja muista terveysongelmistasi
- Mahdollisista käyttämistäsi lääkkeistä (reseptilääkkeistä ja itsehoitolääkkeistä, vitamiineista ja ravintolisistä)
- Jos sinulla:
  - on jokin infektio tai siihen viittaavia oireita (kuten kuumetta, huonosti parantuvia haavaumia, haavoja, väsymystä tai hammasvaivoja)
  - on tai on joskus ollut tuberkuloosi tai olet ollut tekemisissä tuberkuloosia sairastavan henkilön kanssa
  - on tai on aikaisemmin ollut vakava sydänsairaus tai sydämen vajaatoiminta
  - on tai on aikaisemmin ollut syöpä
  - on joskus ollut tunnottomuutta tai kihelmöintiä
  - on jokin hermostoon vaikuttava sairaus, kuten MS-tauti.

Ennen Amgevita-hoidon aloittamista lääkäri tarkistaa, ettei sinulla ole tuberkuloosiin viittaavia merkkejä tai oireita. Jos sinulla on tuberkuloosi, se on hoidettava ennen Amgevita-hoidon aloittamista.

## Mitä minun pitää tehdä Amgevita-hoidon aikana?

Hoidon aikana:

- Kerro lääkärille, tehoaako Amgevita sairauteesi.
- **Ota heti yhteyttä lääkäriin, jos sinulle ilmaantuu haittavaikutuksia.** Lääkäri voi auttaa sinua saamaan haittavaikutukset hallintaan.
  - Jos sinulla todetaan jokin haittavaikutus, lääkäri päättää, voitko jatkaa Amgevita-hoitoa.
- Kerro lääkärille kaikista mahdollisista haittavaikutuksista, joita havaitset viimeisen Amgevita-pistoksesi jälkeen. Tämä on tärkeää, koska haittavaikutuksia voi ilmaantua vielä viimeisen Amgevita-annoksen jälkeen.
- Kerro lääkärille:
  - Kaikista sinulle ilmaantuvista uusista sairauksista
  - Uusista lääkkeistä, joita käytät (näihin kuuluvat reseptilääkkeet ja itsehoitolääkkeet, vitamiinit ja ravintolisät)
  - Mahdollisista sinulle suunnitelluista kirurgisista toimenpiteistä tai leikkauksista.

Amgevita voi joskus aiheuttaa vakavia haittavaikutuksia. Joitakin näistä on kuvattu viereisessä tekstiruudussa. Myös muita haittavaikutuksia voi esiintyä. Lisätietoja haittavaikutuksista on Amgevitan pakkausosteessa. Kerro heti lääkärille, jos sinulle ilmaantuu haittavaikutuksia Amgevita-hoidon aikana. Hän voi ehkä auttaa sinua saamaan haittavaikutukset hallintaan ja estämään niiden pahenemisen.

**Infektiot** – Amgevita-hoitoa saavat potilaat ovat normaalia alttiimpia infektioille, ja infektiot ovat heillä usein vaikeampia. Jotkin infektiot ovat suhteellisen lieviä, kuten tavallinen nuhakuume. Toiset ovat vakavampia ja voivat joissakin tapauksissa johtaa kuolemaan, kuten tuberkuloosi.

**Sydämen vajaatoiminta** – Joillekin Amgevita-hoitoa saaville potilaille voi kehittyä sydämen vajaatoiminta. Amgevita voi myös pahentaa jo olemassa olevaa sydämen vajaatoimintaa joillakin potilailla.

**Syöpä** – Amgevita voi suurentaa tiettyntyyppisten syöpien riskiä.

**Hermoston häiriöt** – Joillakin potilailla Amgevita-hoito voi johtaa hermoston häiriöiden, kuten MS-taudin, kehittymiseen tai pahenemiseen.

Ota yhteyttä terveydenhoitohenkilökuntaan tai hakeudu heti lääkärin hoitoon, jos sinulle ilmaantuu seuraavia oireita, jotka voivat viitata vakaviin haittavaikutuksiin. Tässä ei ole lueteltu kaikkia mahdollisia haittavaikutusten oireita. Kerro heti lääkärille, jos sinulla on Amgevita-hoidon aikana epätavallisia tuntemuksia. Hän voi ehkä auttaa sinua saamaan haittavaikutusten oireet hallintaan ja estämään niiden pahenemisen.

(jatkuu) ►

**Infektio:**

- Kuume
- Vilunväristykset
- Epätavallinen hikoilu
- Huonovointisuus tai epätavallinen väsymys
- Oksentelu tai pahoinvointi
- Ripuli
- Mahakipu
- Ruokahaluttomuus
- Laihtuminen
- Yskä tai verta tai limaa ysköksissä
- Hengenahdistus
- Virtsaamisvaikeudet
- Ihohaavoja
- Huonosti paranevia haavoja tai haavaumia ihossa
- Lihasten aristus
- Hampaiden tai ikenien ongelmat

**Sydämen vajaatoiminta:**

- Hengenahdistus
- Nilkkojen tai jalkojen turvotus
- Nopea painonnousu

**Syöpä:**

- Yöhikoilu
- Turvonneita imusolmukkeita kaulalla, kainaloissa, nivusissa tai muualla elimistössä
- Painon lasku
- Ihomuutosten (luomien tai pisamien) ilmaantuminen tai muuttuminen
- Voimakas kutina

**Hermoston häiriöt:**

- Tunnottomuus tai kihelmöinnin tunne missä tahansa kehon osassa
- Näköhäiriöt
- Lihashyökkäykset
- Huimaus



## Potilastietokortti

Nimesi: \_\_\_\_\_

Lääkärin nimi: \_\_\_\_\_

Lääkärin puhelinnumero:

\_\_\_\_\_

Ensimmäisen Amgevita-pistoksen päivämäärä:

\_\_\_\_\_

Viimeisen Amgevita-pistoksen päivämäärä:

\_\_\_\_\_

Viimeisimmän tuberkuloosikokeen päivämäärä:

\_\_\_\_\_

Onko sinulle tehdyn tuberkuloosikokeen tulos ollut joskus positiivinen?

Kyllä  Ei

Saitko hoitoa positiivisen tuberkuloosikokeen vuoksi?

Kyllä  En

Kuinka pitkään sait tuberkuloosihoitoa?

\_\_\_\_\_



## Sinulle tehdyt tuberkuloosikokeet tai saamasi tuberkuloosihoito:

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

**AMGEN**<sup>®</sup>

Amgen AB, sivuliike Suomessa

Keilaranta 16, PL 86

02101 ESPOO

[www.amgen.fi](http://www.amgen.fi)

Versio 1.0

Hyväksytty: lokakuussa 2018

Materiaalia ei saa käyttää markkinointitarkoituksiin.