

# Kom ihåg-kort för patienter

Erivedge® kan skada ditt foster  
eller orsaka fosterdöd.

F/ERV/1702/0012



Riskhanteringsmaterial – September 2016



▼ Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning.

## Kvinnliga patienter som kan bli gravida måste:

- Alltid använda **2 former** av rekommenderade preventivmetoder under behandling och inom 24 månader efter sin sista dos (se broschyren "Erivedge graviditetsförebyggande program: Information till patienter som tar Erivedge®" för mer information)
- Göra graviditetstester varje månad för att kontrollera om de är gravida.

## Manliga patienter måste:

- Alltid använda kondom (med spermiedödande medel, om tillgängligt) när de har sex med kvinnliga partners under behandling och inom två månader efter sin sista dos.
- Avstå från att donera sperma under behandlingen och inom 2 månader efter den sista dosen.

Du måste omedelbart tala med läkare eller sjukvårdspersonal om du eller din sexpartner inte får menstruation, har missat en menstruation, misstänker graviditet eller är gravid.

### • Kvinnliga patienter:

Prata med läkare om du misstänker att du är gravid medan du tar Erivedge® och inom 24 månader efter din sista dos.

### • Manliga patienter:

Prata med läkare om din kvinnliga partner misstänker att hon är gravid medan du tar Erivedge® och inom två månader efter din sista dos.

## Alla patienter måste:

Aldrig ge detta läkemedel till någon annan person. Avstå från att lämna blod under behandlingen eller inom 24 månader efter den sista dosen. Återlämna alla oanvända kapslar efter avslutad behandling

## Telefonnummer vid nödsituation

Kontorstid	
Utanför kontorstid	