

Sinulle on määrätty Akynzeo® -lääkettä pahoinvoinnin estoon

Mitä Akynzeo on

Akynzeo kapseli sisältää kahta lääkettä (vaikuttavaa ainetta):

- netupitanttia
- palonosetronia

Mihin Akynzeoa käytetään

Akynzeoa käytetään syöpää sairastaville aikuisille pahoinvoinnin ja oksentelun ehkäisyyn syöpähoiton aikana (solunsalpaajahoito).

Miten Akynzeo toimii

Solunsalpaajat voivat saada elimistön vapauttamaan serotoniiniksi ja substanssi P:ksi kutsuttuja aineita. Tämä stimuloi aivojen oksennuskeskusta, mikä aiheuttaa pahoinvointia ja oksentelua. Akynzeon sisältämät lääkkeet kiinnittyvät niihin hermoston reseptoreihin, joiden välityksellä serotoniini ja substanssi P toimivat. Netupitantti (joka on NK₁-reseptorin estäjä) salpaa substanssi P:n reseptorit, ja palonosetroni (joka on 5-HT₃-reseptorin estäjä) salpaa tietyt serotoniinin reseptorit. Estämällä tällä tavoin substanssi P:n ja serotoniinin toimintaa lääkkeet ehkäisevät oksennuskeskuksen stimulointia ja siitä aiheutuvaa pahoinvointia.

Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin otat Akynzeoa

Älä ota Akynzeoa

- jos olet allerginen netupitantille tai palonosetronille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle. Jos olet epävarma, keskustele lääkärin tai sairaanhoitajan kanssa ennen tämän lääkkeen ottamista.
- jos olet raskaana

On erityisen tärkeää, että kerrot lääkärille tai sairaanhoitajalle, jos otat jotakin seuraavista lääkkeistä:

- SSRI-lääkkeiksi (selektiiviksi serotoniinin takaisinoton estäjiksi) kutsutut masennuslääkkeet, kuten fluoksetiini, paroksetiini, sertraliini, fluvoksamiini, sitalopraami tai eskitalopraami
- SNRI-lääkkeiksi (serotoniinin ja noradrenaliinin takaisinoton estäjiksi) kutsutut masennuslääkkeet, kuten venlafaksiini tai duloksetiini

Kuinka paljon lääkettä otetaan

- Suositeltu annos on yksi kapseli (yksi kapseli sisältää 300 mg netupitanttia ja 0,5 mg palonosetronia)
- Ota kapseli noin 1 tunti ennen solunsalpaajahoidon aloittamista
- Voit ottaa Akynzeo-kapselin ruoan kanssa tai ilman ruokaa

Akynzeoa otetaan ennen solunsalpaajahoitoa oksentelun ja pahoinvoinnin ehkäisemiseksi. Älä ota Akynzeoa solunsalpaajahoidon jälkeisinä päivinä – paitsi, jos olet saamassa uuden solunsalpaajahoidon

Yleiset haittavaikutukset

(Saattaa esiintyä korkeintaan yhdellä henkilöllä 10:stä)

- päänsärky
- ummetus
- väsymys

Muut haittavaikutukset

Kysy lääkäriltä tai sairaanhoitajalta muista harvinaisemmista haittavaikutuksista

Tiedot perustuvat valmisteyhteenvedon 2016.

