

# Bruksanvisning\* Caphosol munvatten – 30 brustabletter

- 4-10 doser per dag.
- Använd så länge behandlingen varar eller enligt läkares ordination.



1. Lägg en brustablett i ett glas med 50 ml vatten.



2. Vänta tills tablettens helt har lösts upp. Använd omedelbart efter beredning.



3. Ta hälften av lösningen till munnen. Svälj inte.



4. Skölj munnen noggrant i 1 minut.



5. Spotta lösningen ut. Upprepa med den återstående hälften av Caphosol-lösningen.

Doseringen kan höjas upp till 10 gånger per dag om symtom och smärta från mukositt kvarstår.

 **Caphosol**<sup>®</sup>  
DISPERSIBLE

## Varudeklaration

Ett rör innehåller 30 Brustabletter. **Beredningsform:** Munsköljvätska. Vattenlösning som bildas efter upplösning av Brustablett. Caphosol Dispersible är en lösning som är övermättad med avseende både på kalcium- och fosfatjoner. **Ingredienser:** Dibasiskt natriumfosfat 0,032, monobasiskt natriumfosfat 0,009, kalciumklorid 0,052 (% w/w). **Hjälpämnen:** Maltodextrin, natriumvätekarbonat, natriumkarbonat, citronsyra, sorbitol. **Funktion:** Caphosol Dispersible är en Brustablett som ska lösas upp i vatten för att erhålla en elektrolytlösning avsedd att fukta, smörja och rengöra munhålan inklusive munnens, tungans och svalgets slemhinnor. **Indikationer:** Caphosol Dispersible är indicerad för torrhet i munnen och svalget (hyposalivation, xerostomi), oavsett orsak och oavsett om tillståndet är tillfälligt eller bestående. Caphosol Dispersible är även indicerad som tillägg till peroral standardbehandling för att förebygga och behandla mukositis som kan orsakas av strålbehandling eller höga doser kemoterapi. Lindring av torra munslemhinnor vid dessa tillstånd är förknippad med lindring av smärta.

### Bruksanvisning:

- Lägg en Brustablett i ett glas med 50 ml vatten och vänta tills tablett helt har lösts upp. Använd helst vatten på flaska men vanligt kranvatten kan användas under förutsättning att vattnet har lag hårdhetsgrad. På sjukhus rekommenderas renat vatten.
- Skölj munnen noggrant i 1 minut med hälften av lösningen och spotta ut.
- Upprepa med den återstående hälften av lösningen och spotta ut.
- Använd omedelbart efter beredning.

### Dosering:

*Vid användning av höga doser av kemoterapi och strålbehandling:* 4 doser per dag från det att cancerbehandlingen initieras. Doseringen kan höjas upp till 10 gånger per dag om symtom och smärta från mukositis kvarstår. Använd så länge behandlingen varar eller enligt läkares ordination.

*Lindring av muntorrhet:* Den initiala rekommenderade startdosen är 4 doser per dag. Doseringen kan höjas upp till 10 gånger per dag om symtomen kvarstår eller enligt läkares ordination.

**Interaktioner med andra behandlingar:** Det finns inga kända interaktioner med läkemedel eller andra produkter. **Särskilda försiktighetsåtgärder vid användning:** Undvik att äta eller dricka i åtminstone 15 minuter efter användning. Se till att hålla röret väl tillslutet. Använd inte om röret är skadat. Innehåller natrium (1 g per 50 ml). Patienter som ordinerats saltfattig kost bör rådfråga sin läkare före användning. Förvaras utom räckhåll för barn. Får ej frysas. Inga negativa effekter är förväntade om Caphosol Dispersible sväljs av misstag.

### Tilläggsinformation:

Oy Swedish Orphan Biovitrum Ab (Sobi)  
tel. 0201 558 840  
www.caphosol.fi (på finska)