

LITALGIN®-VALMISTEEN POTILASKORTTI

Tutustu huolellisesti tähän potilaskorttiin ja lue lääkepakkauksessa oleva pakkausseloste ennen Litalgin-valmisteen käyttöä.

HYVÄKSYTYT KÄYTTÖAIHEET

Litalgin-valmistetta tulee käyttää vain sen hyväksytyihin käyttöaiheisiin, jotka ovat

- Ruoansulatuskanavan sekä sappi- ja virtsateiden koliikkikivut
- Rakkokouristukset.

LITALGIN®-VALMISTEEN KÄYTTÖÖN LIITTYVIÄ VAROTOIMIA

- Litalgin-valmisteen käyttöön voi liittyä harvinaisena haittavaikutuksena:
 - Luuytimen toiminnan häiriö ja merkittävä veren valkosolujen määrän väheneminen (agranulosytoosi). Sen oireita voivat olla selittämätön kuumeilu, suun limakalvojen tulehdukset sekä nivelvaivat.
 - Äkillinen yliherkkyysoire (anafylaktinen reaktio), jonka oireita voivat olla hengitysvaikeudet, turvotukset, ihon punoitus, yleinen kutina, nielun tai kurkunpään turpoaminen, huimaus ja pahoinvointi.
- Mikäli agranulosytoosin tai anafylaktisen reaktion oireita ilmenee, tulee Litalgin-valmisteen käyttö lopettaa välittömästi ja sinun tai hoitoosi osallistuvan henkilön tulee ottaa yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai ensiapuun.
- Agranulosytoosiriskin vuoksi Litalgin-valmistetta tulee käyttää vain lyhyimmän tarvittavan ajan.
- Jos käytät Litalgin-valmistetta yli viikon ajan, tulee sinun käydä viikoittain verikokeissa lääkärin ohjeen mukaan veren valkosoluarvojen tarkistamiseksi.

Saat tietoa Litalgin-valmisteesta myös täältä:

Takeda Oy, puh: 020 746 5000, s-posti: infoposti@takeda.com

Tämän materiaalin on laatinut:

Takeda Oy

