

# TOUJEO® (INSULIN GLARGIN 300 enheter/ml)

Toujeo® 300 E/ml SoloStar®, injektionsvätska, lösning i förfylld injektionspenna  
Toujeo® 300 E/ml DoubleStar™, injektionsvätska, lösning i förfylld injektionspenna

## GUIDE FÖR SJUKVÅRDSPERSONAL

- Denna guide är endast avsedd som en vägledning för att undvika felmedicinering. Läs produktresumén före förskrivning och expediering av Toujeo®-insulin.
- Ge patienten patientguiden före förskrivning eller expediering av Toujeo® om det är första gången eller vid byte till en ny penna för att försäkra att patienterna och deras vårdgivare är adekvat informerade om hur de ska använda Toujeo® för att minska risken för felmedicinering.

## Viktig information om justeringar de första veckorna vid förskrivning av Toujeo®

- Insulin glargin 100 enheter/ml och Toujeo® (insulin glargin 300 enheter/ml) är inte bioekvivalenta och därför inte utbytbara utan dosjustering.
- Dosjustering kan bli nödvändig när patienter byter till ett insulin med en annan styrka.
- Toujeo®s dosregimen (dos och tidpunkt) bör justeras enligt det individuella svar man får på behandlingen. Efter initiering har man sett att det med styrkan på 300 enheter/ml kan krävas i genomsnitt en 10-18% högre insulindos för att uppnå motsvande glukoskontroll som med 100 enheter/ml.
- Toujeo® (insulin glargin 300 enheter/ml) finns tillgängligt i två olika pennor:



Dosinställningen med Toujeo® SoloStar® är 1 enhet åt gången och med

Toujeo® DoubleStar™ är den 2 enheter åt gången.

Den dos som levereras är den som visas i doseringsfönstret.

## Byte från annat basinsulin till Toujeo

- Vid byte från en behandlingsregim med ett medel- eller långverkande insulin till en dosregim med Toujeo, kan en ändring av dosen av basinsulinet krävas och annan samtidig behandling behöva anpassas. Noggrann kontroll av blodsockret rekommenderas under övergången och de efterföljande veckorna.
- **Byte från basinsulin, doserat en gång per dag, till Toujeo<sup>®</sup>, doserat en gång per dag, kan göras enhet för enhet baserat på tidigare dos.**
- **Vid byte från basinsulin, doserat två gånger per dag, till Toujeo<sup>®</sup>, doserat en gång per dag, rekommenderas en initialdos på 80% av tidigare totala dagliga dosen basinsulin.**
- Noggrann kontroll av blodsockret rekommenderas under övergången och de efterföljande veckorna.

## Byte från Toujeo<sup>®</sup> till andra basinsuliner

- Byte från Toujeo<sup>®</sup> (insulin glargin 300 enheter/ml) till Lantus<sup>®</sup> (insulin glargin 100 enheter/ml) kan öka risken för hypoglykemier, framförallt första veckan efter bytet.
- För att reducera denna hypoglykemirisk bör dosen reduceras med 20% för de patienter som byter från Toujeo<sup>®</sup> (insulin glargin 300 enheter/ml) en gång om dagen till Lantus<sup>®</sup> (insulin glargin 100 enheter/ml) en gång om dagen.

För mer information om Toujeo<sup>®</sup>, vänligen se produktresumén.

Ge din patient patientguiden och rekommendera att han/hon läser igenom den och bipacksedeln noggrant.

Uppmana patienten att ta med patientguiden till apoteket.

### Rapportering av biverkningar:

Rapportera felmedicinering eller biverkningar eventuellt förknippade med användning av Toujeo<sup>®</sup> till Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea: [www.fimea.fi](http://www.fimea.fi) eller innehavaren av godkännandet för försäljning: [pharmacovigilance.finland@sanofi.com](mailto:pharmacovigilance.finland@sanofi.com) eller tel. 0201 200 368.