

1 INLEDNING

HUMIRA används för behandling av vissa sjukdomar som påverkar immunsystemet. HUMIRA har vanligen god effekt vid behandling av dessa sjukdomar, men läkemedlet kan orsaka vissa biverkningar. Det är viktigt att du diskuterar HUMIRA-behandlingens eventuella nytta och biverkningar med din läkare, eftersom dessa kan variera från patient till patient.

- Syftet med detta kort är att berätta om vissa eventuella biverkningar av HUMIRA.
- Eventuella allvarliga biverkningar är bl.a. infektioner, hjärtsvikt, cancer och störningar i nervsystemet.
- Också andra biverkningar kan förekomma.

Diskutera ditt hälsotillstånd regelbundet med din läkare, så att läkaren kan säkerställa att HUMIRA-behandlingen är effektiv och säker för dig. Berätta genast för läkaren om ditt hälsotillstånd förändras.

2 FÖRE BEHANDLINGEN MED HUMIRA

Berätta för läkaren om eventuella sjukdomar och besvär samt läkemedel du använder. På detta sätt kan läkaren tillsammans med dig besluta om HUMIRA är en lämplig behandling för dig.

Berätta för din läkare:

- Om du har någon infektion eller symptom som tyder på en infektion (t.ex. feber, sår, trötthet eller tandbesvär).

- Om du har tuberkulos eller om du har träffat en person som har tuberkulos.
- Om du har eller har haft någon allvarlig hjärtsjukdom eller hjärtsvikt.
- Om du har eller har haft cancer.
- Om du har domningar, pirrande känsla eller någon sjukdom som påverkar nervsystemet, t.ex. multipel skleros.

Innan behandlingen med HUMIRA inleds, måste din läkare kontrollera att du inte har symptom eller tecken på tuberkulos. Om du har tuberkulos, måste den behandlas innan behandlingen med HUMIRA inleds.

3 UNDER BEHANDLINGEN MED HUMIRA

Håll din läkare uppdaterad om hur HUMIRA-behandlingen verkar i ditt fall. Det är viktigt att du genast kontaktar din läkare om du har avvikande symptom. På detta sätt får du säkert lämplig behandling. Också risken för att biverkningen förvärras minskar.

- Många biverkningar, såsom infektioner, kan fås under kontroll, om du genast berättar om dem för din läkare.
- Om du får biverkningar, beslutar din läkare om behandlingen med HUMIRA ska avslutas eller fortsätta. Det är viktigt att du diskuterar frågan med din läkare.
- Biverkningar kan förekomma ännu

efter den sista dosen HUMIRA, så berätta om eventuella besvär för din läkare ännu i 4 månader efter den sista HUMIRA-injektionen.

Berätta om följande för din läkare:

- Eventuella nya sjukdomar eller symptom.
- Nya läkemedelsbehandlingar.
- Eventuella planerade operationer eller andra ingrepp.

HUMIRA-behandlingen kan ibland orsaka allvarliga biverkningar, t.ex. följande:

INFEKTIONER

HUMIRA används för behandling av vissa inflammatoriska sjukdomar. Läkemedlet verkar genom att hämma vissa funktioner av immunsystemet. Dessa funktioner

deltar dock också i bekämpningen av infektioner. HUMIRA kan alltså utsätta dig för infektioner eller förvärra pågående infektioner. Detta gäller allt från flunssa till allvarligare infektioner (t.ex. tuberkulos).

HJÄRTSVIKT

Behandlingen har i vissa fall orsakat hjärtsvikt eller förvärrat denna.

CANCER

Andvändning av HUMIRA kan öka risken för vissa typer av cancer.

STÖRNINGAR I NERVSYSTEMET

HUMIRA har i vissa fall orsakat störningar i nervsystemet eller förvärrat besvär som patienten haft sedan tidigare, t.ex. multipel skleros.

Läs mera i bipacksedeln för HUMIRA. Också andra biverkningar kan förekomma under behandlingen med HUMIRA.

AbbVie Oy
Gårdsbrinken 1, 02240 ESBO
Telefon 010 2411 200

FIHUM130243c(2)/RMP/21.9.2015