



## POTILASKORTTI



Tässä kortissa on joitakin tärkeitä turvallisuustietoja, joista potilaan on hyvä olla tietoinen ennen HUMIRA®-hoitoa ja sen aikana.

- Pidä tämä kortti aina mukana, myös vielä 4 kk ajan viimeisen HUMIRA-injektion jälkeen.
- Näytä tämä kortti aina, kun asioit lääkärin tai muun terveydenhuoltohenkilöstön kanssa.
- Kirjaa tämän kortin takapuolelle tiedot mahdollisista tuberkuloositutkimuksista tai -hoidoista.

Tässä kortissa ei ole lueteltu kaikkia mahdollisia haittavaikutuksia.

- Lisätietoa haittavaikutuksista saat HUMIRA-pakkausselosteesta tai lääkäritäsi.

### Tietoja sinulle ja sinua hoitavalle terveydenhuoltohenkilöstölle

Nimesi

Lääkärin nimi (HUMIRAn määrännyt lääkäri)

Lääkärin puhelinnumero

Ensimmäisen HUMIRA-injektion pvm

HUMIRA-annos

Viimeisen HUMIRA-injektion pvm  
(jos et enää käytä HUMIRAA)

### Tuberkuloositutkimukset ja -hoito

Rastita tämä ruutu, jos sinulle on joskus tehty tuberkuloositutkimuksia:

KYLLÄ (jos et tiedä, kysy lääkäritäsi.)

Rastita tämä ruutu, jos sinulle on joskus tehty tuberkuloositutkimus, jonka tulos oli positiivinen:

KYLLÄ (jos et tiedä, kysy lääkäritäsi.)

Rastita tämä ruutu, jos olet joskus käyttänyt lääkkeitä tuberkuloosin ehkäisyyn tai hoitoon:

KYLLÄ (jos et tiedä, kysy lääkäritäsi.)

Lue lisätietoja HUMIRA-pakkausselosteesta. Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärisi tai muun terveydenhuoltohenkilöstön puoleen.

### Ota heti yhteys lääkäriisi tai mene sairaalaan, jos sinulla on seuraavassa lueteltuja vakavien haittavaikutusten oireita:

#### INFEKTIOT

Kuume, vilunväristykset, voimakas hikoilu, huonovointisuus tai tavallista voimakkaampi väsymys, pahoinvointi tai oksentelu, ripuli, vatsakipu, ruokahaluttomuus tai painon lasku, yskä ja veriset tai limaiset yskökset, hengenahdistus, virtsaamisvaikeudet, ihon haavaumat, haavat, lihaskivut, hammasvaivat.

#### SYDÄMEN VAJAATOIMINTA

Hengenahdistus, nilkkojen tai jalkaterien turvotus, äkillinen painonnousu.

#### SYÖPÄ

Yöhikoilu, kaulan, kainaloiden, nivusten tai muiden alueiden imusolmukkeiden turvotus, painon lasku, uudet ihomuutokset tai ihossa jo olevien luomien tai pisamien muutokset, vaikea, selittämätön kutina.

#### HERMOSTON HÄIRIÖT

Tunnottomuus tai kihelmöinti, näköhäiriöt, lihasheikkous, selittämätön huimaus.

**Jos sinulla on HUMIRA-hoidon aikana epätavallisia oireita, kerro niistä aina lääkärillesi. Näihin haittavaikutuksiin saattaa liittyä muitakin oireita.**

Merkintöjä (kommentteja tai kysymyksiä lääkäriille)

## 1 JOHDANTO

HUMIRAA käytetään tiettyjen immuunijärjestelmään vaikuttavien sairauksien hoitoon. HUMIRAN teho näiden sairauksien hoidossa on yleensä hyvä, mutta lääke saattaa aiheuttaa joitakin haittavaikutuksia. On tärkeää, että keskustele lääkärisi kanssa HUMIRAHoidon mahdollisista hyödyistä ja haittavaikutuksista, jotka voivat vaihdella potilaskohtaisesti.

- Tämän kortin tarkoituksena on kertoa tietyistä HUMIRAN mahdollisista haittavaikutuksista.
- Mahdollisia vakavia haittavaikutuksia ovat mm. infektiot, sydämen vajaatoiminta, syöpä ja hermoston häiriöt.
- Muitakin haittavaikutuksia saattaa esiintyä.

Keskustele lääkärisi kanssa säännöllisesti voinnistasi, jotta voidaan varmistaa, että HUMIRA-hoito on sinulle tehokas ja turvallinen. Kerro heti lääkärillesi, jos voitisi muuttua.

## 2 ENNEN HUMIRA-HOITOA

Kerro lääkärillesi mahdollisista sairauksistasi ja vaivoistasi ja käyttämästäsi lääkkeistä. Näin voitte päättää yhdessä lääkärisi kanssa, sopiiko HUMIRA-hoito sinulle.

### Kerro lääkärillesi seuraavista seikoista:

- Jos sinulla on jokin infektio tai siihen viittaavia oireita (kuten kuumetta, haavaumia, väsymystä tai hampasmaivoja).
- Jos sinulla on tuberkuloosi tai jos olet ollut tekemisissä tuberkuloosia sairas-

tavan henkilön kanssa.

- Jos sinulla on tai on ollut vakavia sydänvaivoja tai sydämen vajaatoiminta.
- Jos sinulla on tai on ollut syöpä.
- Jos sinulla on tunnottomuutta, kihelmöintiä tai jokin hermostoon vaikuttava sairaus, kuten MS-tauti.

Ennen HUMIRA-hoidon aloittamista lääkärisi on tutkittava, ettei sinulla ole tuberkuloosin oireita tai löydöksiä. Jos sinulla on tuberkuloosi, se on hoidettava ennen HUMIRA-hoidon aloittamista.

## 3 HUMIRA-HOIDON AIKANA

Pidä lääkärisi ajan tasalla siitä, miten HUMIRA-hoito kohdallasi tehoaa. **On tärkeää, että otat heti yhteyden lääkäriisi, jos sinulla on epätavallisia oireita.** Näin saat varmasti sopivaa hoitoa. Myös

haittavaikutuksen pahenemisen riski pienenee.

- Monet haittavaikutukset, kuten infektiot voidaan saada hallintaan, jos kerrot niistä heti lääkärillesi.
- Jos sinulla on haittavaikutuksia, lääkärisi päättää, lopetetaanko HUMIRA-hoito vai jatketaanko sitä. On tärkeää, että keskustele asiasta lääkärisi kanssa.
- Haittavaikutuksia voi esiintyä vielä viimeisen HUMIRA-annoksen jälkeen, joten kerro lääkärillesi mahdollisista vaivoista vielä 4 kk ajan viimeisen HUMIRA-injektion jälkeen.

### Kerro lääkärillesi seuraavista seikoista:

- Mahdolliset uudet sairaudet tai oireet.
- Uudet lääkitykset.

- Mahdollisesti suunnitellut leikkaukset tai muut toimenpiteet.

### HUMIRA-hoito voi joskus aiheuttaa vakavia haittavaikutuksia, esim. seuraavia:

#### INFEKTIOT

HUMIRAA käytetään tiettyjen tulehdussairauksien hoitoon. Se vaikuttaa estämällä tiettyjä immuunijärjestelmän toimintoja. Ne osallistuvat kuitenkin myös infektioiden torjumiseen. HUMIRA voi siis altistaa infektioille tai pahentaa meneillään olevia infektioita, niin flunssia kuin vakavampiakin infektioita (kuten tuberkuloosia).

#### SYDÄMEN VAJAATOIMINTA

Hoito on joissakin tapauksissa aiheuttanut sydämen vajaatoiminnan tai pahentanut sitä.

#### SYÖPÄ

HUMIRAN käyttö voi suurentaa tiettyjen tyyppisten syöpien todennäköisyyttä.

#### HERMOSTON HÄIRIÖT

HUMIRA on joissakin tapauksissa aiheuttanut hermoston häiriöitä tai pahentanut potilaalla jo olevia vaivoja, myös MS-tautia.

Lue lisätietoja HUMIRA-pakkausselesteesta. HUMIRA-hoidon aikana voi esiintyä muitakin haittavaikutuksia.

AbbVie Oy  
Pihatörmä 1, 02240 ESPOO  
Puhelin 010 2411 200

FIHUM130243d(1)/RMP/5.9.2016

