



## POTILASKORTTI lapset



Tässä kortissa on joitakin tärkeitä turvallisuustietoja, joista sinun on hyvä olla tietoinen ennen lapsesi HUMIRA®-hoitoa ja sen aikana.

- Pidä tämä kortti aina mukana, myös vielä 4 kk ajan lapsesi viimeisen HUMIRA-injektion jälkeen.
- Näytä tämä kortti aina, kun asioit lapsesi lääkärin tai muun terveydenhuoltohenkilöstön kanssa.
- Kirjaa tähän korttiin tiedot mahdollisista tuberkuloositutkimuksista tai -hoidoista.

Tässä kortissa ei ole lueteltu kaikkia mahdollisia haittavaikutuksia.

- Lisätietoa haittavaikutuksista saat HUMIRA-pakkausselosteesta tai lastasi hoitavalta lääkäriltä.

### Tietoja sinulle ja lastasi hoitavalle terveydenhuoltohenkilöstölle

Potilaan nimi

Lääkärin nimi (HUMIRAn määrännyt lääkäri)

Lääkärin puhelinnumero

Ensimmäisen HUMIRA-injektion pvm

HUMIRA-annos

Viimeisen HUMIRA-injektion pvm  
(jos lapsesi ei enää käytä HUMIRAA)

### Tuberkuloositutkimukset ja -hoito

Rastita tämä ruutu, jos lapsellesi on joskus tehty tuberkuloositutkimuksia:

KYLLÄ (Jos et tiedä, kysy lastasi hoitavalta lääkäriltä.)

Rastita tämä ruutu, jos lapsellesi on joskus tehty tuberkuloositutkimus, jonka tulos oli positiivinen:

KYLLÄ (Jos et tiedä, kysy lastasi hoitavalta lääkäriltä.)

Rastita tämä ruutu, jos lapsesi on joskus käyttänyt lääkkeitä tuberkuloosin ehkäisyyn tai hoitoon:

KYLLÄ (Jos et tiedä, kysy lastasi hoitavalta lääkäriltä.)

**Lue lisätietoja HUMIRA-pakkausselosteesta.** Jos sinulla on kysyttävää, käänny lastasi hoitavan lääkärin tai muun terveydenhuoltohenkilöstön puoleen.

**Ota heti yhteys lastasi hoitavaan lääkäriin tai menkää sairaalaan, jos lapsellasi on seuraavassa lueteltuja vakavien haittavaikutusten oireita:**

### INFEKTIOT

Kuume, vilunväristykset, voimakas hikoilu, huonovointisuus tai tavallista voimakkaampi väsymys, pahoinvointi tai oksentelu, ripuli, vatsakipu, ruokahaluttomuus tai painon lasku, yskä ja veriset tai limaiset yskökset, hengenahdistus, virtsaamisvaikeudet, ihon haavaumat, haavat, lihaskivut, hammasvaivat.

### SYDÄMEN VAJAATOIMINTA

Hengenahdistus, nilkkojen tai jalkaterien turvotus, äkillinen painonnousu.

### SYÖPÄ

Yöhikoilu, kaulan, kainaloiden, nivusten tai muiden alueiden imusolmukkeiden turvotus, painon lasku, uudet ihomuutokset tai ihossa jo olevien luomien tai pisamien muutokset, vaikea, selittämätön kutina.

### HERMOSTON HÄIRIÖT

Tunnottomuus tai kihelmöinti, näköhäiriöt, lihasheikkous, selittämätön huimaus.

**Jos lapsellasi on HUMIRA-hoidon aikana epätavallisia oireita, kerro niistä aina lastasi hoitavalle lääkärille. Näihin haittavaikutuksiin saattaa liittyä muitakin oireita.**

Merkintöjä (kommentteja tai kysymyksiä lastasi hoitavalle lääkärille)



## 1 JOHDANTO

HUMIRAA käytetään tiettyjen immuunijärjestelmään vaikuttavien sairauksien hoitoon. HUMIRAn teho näiden tautien hoidossa on yleensä hyvä, mutta lääke saattaa aiheuttaa joitakin haittavaikutuksia. On tärkeää, että keskustele lastasi hoitavan lääkärin kanssa HUMIRA-hoidon mahdollisista eduista ja haittavaikutuksista, jotka voivat vaihdella potilaskohtaisesti.

- Tämän kortin tarkoituksena on kertoa tietyistä HUMIRAn mahdollisista haittavaikutuksista.
- Mahdollisia vakavia haittavaikutuksia ovat mm. infektiot, sydämen vajaatoiminta, syöpä ja hermoston häiriöt.
- Muitakin haittavaikutuksia saattaa esiintyä.

Keskustele lastasi hoitavan lääkärin kanssa säännöllisesti lapsesi voinnista, jotta voidaan varmistaa, että HUMIRA-hoito on lapsellesi tehokas ja turvallinen. Kerro heti lastasi hoitavalle lääkärille, jos lapsesi vointi muuttuu.

## 2 ENNEN HUMIRA-HOITOA

Kerro lastasi hoitavalle lääkärille lapsesi mahdollisista sairauksista, vaivoista ja käyttämistä lääkkeistä. Näin voitte päättää yhdessä lastasi hoitavan lääkärin kanssa, sopiiko HUMIRA-hoito lapsellesi.

### Kerro lastasi hoitavalle lääkärille seuraavista taseikoista:

- Jos lapsellasi on jokin infektio tai siihen viittaavia oireita (kuten kuumetta, haavaumia, väsymystä tai hammasvaivoja).

- Jos lapsellasi on tuberkuloosi tai jos lapsesi ollut tekemisissä tuberkuloosia sairastavan henkilön kanssa.
- Jos lapsellasi on tai on ollut vakavia sydänvaivoja tai sydämen vajaatoiminta.
- Jos lapsellasi on tai on ollut syöpä.
- Jos lapsellasi on tunnottomuutta, kihelmöintiä tai jokin hermostoon vaikuttava sairaus, kuten MS-tauti.

Ennen HUMIRA-hoidon aloittamista lastasi hoitavan lääkärin on tutkittava, ettei lapsellasi ole tuberkuloosin oireita tai löydöksiä. Jos lapsellasi on tuberkuloosi, se on hoidettava ennen HUMIRA-hoidon aloittamista.

## 3 HUMIRA-HOIDON AIKANA

Pidä lääkäri ajan tasalla siitä, miten HUMIRA-hoito lapsesi kohdalla tehoaa.

### On tärkeää, että otat heti yhteyden lastasi hoitavaan lääkäriin, jos lapsellasi on epätavallisia oireita.

- Näin lapsesi saa varmasti sopivaa hoitoa. Myös haittavaikutuksen pahenemisen riski pienenee.
- Monet haittavaikutukset, kuten infektiot voidaan saada hallintaan, jos kerrot niistä heti lastasi hoitavalle lääkärille.
  - Jos lapsellasi on haittavaikutuksia, lastasi hoitava lääkäri päättää, lopetetaanko HUMIRA-hoito vai jatketaanko sitä. On tärkeää, että keskustele asiasta lastasi hoitavan lääkärin kanssa.
  - Haittavaikutuksia voi esiintyä vielä viimeisen HUMIRA-annoksen jälkeen joten kerro lastasi hoitavalle lääkärille mahdollisista vaivoista vielä 4 kk ajan viimeisen HUMIRA-injektion jälkeen.

### Kerro lastasi hoitavalle lääkärille seuraavista seikoista:

- Mahdolliset uudet sairaudet tai oireet.
- Uudet lääkitykset.
- Mahdollisesti suunnitellut leikkaukset tai muut toimenpiteet.

### HUMIRA-hoito voi joskus aiheuttaa vakavia haittavaikutuksia, esim. seuraavia:

#### INFEKTIOT

HUMIRAA käytetään tiettyjen tulehdussairauksien hoitoon. Se vaikuttaa estämällä tiettyjä immuunijärjestelmän toimintoja. Ne osallistuvat kuitenkin myös infektioiden torjumiseen. HUMIRA voi siis altistaa infektioille tai pahentaa meneillään olevia infektioita, niin flunssia kuin vakavampiakin infektioita (kuten tuberkuloosia).

#### SYDÄMEN VAJAATOIMINTA

Hoito on joissakin tapauksissa aiheuttanut sydämen vajaatoiminnan tai pahentanut sitä.

#### SYÖPÄ

HUMIRAn käyttö voi suurentaa tiettyjen tyyppisten syöpien todennäköisyyttä.

#### HERMOSTON HÄIRIÖT

HUMIRA on joissakin tapauksissa aiheuttanut hermoston häiriöitä tai pahentanut potilaalla jo olevia vaivoja, myös MS-tautia.

Lue lisätietoja HUMIRA-pakkausselosteesta. HUMIRA-hoidon aikana voi esiintyä muitakin haittavaikutuksia.

AbbVie Oy  
Pihatörmä 1, 02240 ESPOO  
Puhelin 010 241 1200

FIHUM130244a(3)/RMP/17.8.2015

