



# Titrausvaihe:

Titrauksen avulla pyritään hakemaan kullekin potilaalle sopiva yksilöllinen annos. Tämä toteutetaan yleensä 8 viikon kuluessa.

-  200 mikrogramman tabletti
-  800 mikrogramman tabletti

## Titrauspakkaus\*

Alussa otetaan 200 mikrogramman annos kerran aamuisin ja kerran iltaisin [x 2] eli 12 tunnin välein. Siedettävyyttä paranevat, kun tabletit otetaan ruoan kanssa. Ensimmäinen tabletti tulee ottaa illalla.



## Tablettikuorman pienentäminen†

Jos yli 800 mikrogramman annos on tarpeen, potilaille voidaan antaa:



+



Uusi 200 mikrogramman Uptravi-titraus-pakkaus


Pakkaus 800 mikrogramman Uptravi-tabletteja

## Potilaan seuranta

Annosta suurennetaan, kunnes kehittyvät siedämättömiä haittavaikutuksia tai haittavaikutuksia, joiden lääketieteellinen hoito ei onnistu‡

## Enimmäisannos

Enimmäisannos on 1600 mikrogrammaa



## Annoksen suurentaminen

Annosta suurennetaan 200 mikrogrammaa x 2 kerrallaan. Kukin annosteluvaihe kestää noin yhden viikon, mahdollisesti kuitenkin pidempään. Kunkin vaiheen ensimmäinen annos tulee ottaa illalla

## Annoksen pienentäminen

Jos potilas saavuttaa annoksen, jota hän ei siedä tai jonka haittavaikutusten lääketieteellinen hoito ei onnistu, annosta pienennetään edelliselle annostasolle

## Ylläpitovaihe

Suurinta siedettyä annosta aletaan käyttää yksilöllisenä ylläpitoannoksena. Potilas voi siirtyä ottamaan kyseisen annoksen yhtenä tablettina kahdesti vuorokaudessa. Annos ei saa koskaan olla yli 1600 mikrogrammaa x 2

(Ei vastaa tabletin todellista kokoa.)

\* Titrauspakkauksessa on 140 kalvopäällysteistä 200 mikrogramman Uptravi-tablettia. Nämä tabletit riittävät annostitraukseen enintään 800 mikrogramman annokseen asti.

† Näiden kahden pakkauksen tabletit riittävät titraukseen 1600 mikrogramman annokseen asti.

‡ Yleisimpiä Uptravi-hoidon aikana mahdollisesti esiintyviä haittavaikutuksia ovat päänsärky, ripuli, pahoinvointi ja oksentelu, leukakipu, lihaskipu, raajakipu, nivelkipu ja punastuminen. Täydellinen haittavaikutusluettelo, ks. lisätiedot valmisteyhteenvedosta.

Tutustukaa täydelliseen valmisteyhteenvetoon.

## Hoidon aloitus

Uptravi-hoito on aloitettava keuhkovaltimoiden verenpainetaudin hoitoon perehtyneen lääkärin määräyksestä ja valvonnassa

### Potilaiden titrauspakkaukseen kuuluu:

- Kalvopäällysteisiä 200 mikrogramman Uptravi-tabletteja titrausta varten
- Potilaalle suunnattu titrausopas, jossa kerrotaan titrausprosessista, ja päiväkirja päivittäin otettavan tablettimäärän kirjaamiseen
  - Hoidon alussa on tärkeää tutustua titrausoppaaseen yhdessä potilaan kanssa ja varmistaa, että potilas ymmärtää prosessin ja on varautunut mahdollisiin haittavaikutuksiin

**Huom.** Jos yli 800 mikrogramman annos on tarpeen, potilaille voidaan tablettikuorman pienentämiseksi antaa uusi 200 mikrogramman Uptravi-titrauspakkaus ja pakkaus 800 mikrogramman Uptravi-tabletteja



## Yhteydenpito potilaan kanssa

- Ottakaa titrausvaiheessa yhteys potilaaseen kerran viikossa, keskustelkaa hoidon sujumisesta ja varmistakaa, että mahdollisia lääkkeen farmakologisesta vaikutuksesta johtuvia haittavaikutuksia hoidetaan tehokkaasti
- Uptravi-valmisteen farmakologiseen vaikutukseen liittyviä haittavaikutuksia on ilmoitettu usein etenkin yksilöllisen annostitrausvaiheen aikana. Niitä ovat esim. päänsärky, ripuli, leukakipu, pahoinvointi, lihaskipu, oksentelu, ääreisöien kipu, kuumat aallot ja nivelkipu
- Odotettavissa olevat farmakologiset haittavaikutukset ovat yleensä ohimeneviä tai hoidettavissa oireenmukaisesti
- Käytännön kliinisessä työssä ruoansulatuskanavan tapahtumien on todettu reagoivan ripuli-, oksentelu- ja pahoinvointilääkkeisiin ja/tai ruoansulatuskanavan toiminnallisten häiriöiden hoitoon käytettäviin lääkkeisiin. Kipuun liittyviä tapahtumia on usein hoidettu kipulääkkeillä (esim. parasetamolilla)

## Ylläpitohoito

- Kun ylläpitoannos saavutetaan, potilaalle voidaan määrätä yksilöllistä ylläpitoannosta vastaavaa yhden tabletin tablettivahvuutta (saatavilla on 200–1 600 mikrogramman tabletteja)
- Näin potilas voi ottaa yhden tabletin aamulla ja yhden illalla
- Jokaisen potilaan tilanne on omanlaisensa, eivätkä kaikki käytä samaa ylläpitoannosta. Annos ei saa koskaan olla yli 1 600 mikrogrammaa x 2

Ylläpitohoitoon tarkoitettujen yhden tabletin vahvuudet ovat keskenään erivärisiä, ja niihin on painettu annoksen osoittava numero (annos satoina mikrogrammoina)



(Ei vastaa tabletin todellista kokoa.)

**Uptravi.**  
kalvopäällysteinen tabletti  
seleksipagi



© 2016 Actelion Pharmaceuticals Ltd.  
PRP-F-UPT-007-2016-AUG