

# Potilaan muistutuskortti

Erivedge® voi aiheuttaa haittaa sikiölle  
tai johtaa sikiön kuolemaan.

F/ERN/1702/0007



Riskienhallintamateriaali – Syyskuu 2016



Tähän lääkkeeseen kohdistuu lisäseuranta.

## Naispotilaiden, jotka voivat tulla raskaaksi on:

- käytettävä aina **kahta** (2) suositeltavaa ehkäisy muotoa hoidon aikana ja 24 kuukauden ajan viimeisen annoksen jälkeen (ks. lisätietoa esitteestä ”Erivedge®-valmisteen raskaudenehkäisyohjelma: tietoa Erivedge®-valmistetta käyttäville potilaille”)
- käytävä joka kuukausi raskaustestissä raskauden mahdollisuuden poissulkemiseksi.

## Miespotilaiden on:

- käytettävä aina kondomia (ja spermisidiä, jos saatavilla) ollessaan yhdynnässä naisen kanssa hoidon aikana ja 2 kuukauden kuluessa viimeisen lääkeannoksen jälkeen.
- Siittiöiden luovuttaminen on kiellettyä hoidon aikana ja 2 kuukauden ajan viimeisen annoksen jälkeen.

Ota heti yhteys lääkäriin tai muuhun terveydenhuollon ammattilaiseen, jos kuukautiset jäävät väliin, epäilet raskautta tai olet raskaana. Tämä koskee myös miespotilaiden seksikumppaneita.

### • Naispotilaat:

Kerro lääkäriille, jos epäilet tulleesi raskaaksi Erivedge®-hoidon aikana tai 24 kuukauden kuluessa viimeisen annoksen jälkeen.

### • Miespotilaat:

Kerro lääkäriille, jos naispuolinen kumppanisi epäilee tulleensa raskaaksi Erivedge®-hoitosi aikana tai 2 kuukauden kuluessa viimeisen lääkeannoksesi jälkeen.

## Kaikkien potilaiden täytyy:

Älä koskaan anna tätä lääkettä kenellekään muulle. Älä luovuta verta hoidon aikana tai 24 kuukauden kuluessa viimeisen annoksen jälkeen. Palauta kaikki käyttämättömät kapselit hoidon lopussa.

## Puhelinnumero hätätilanteita varten

Virka-aikana	
Virka-ajan ulkopuolella	