

Cibinqo (abrocitinib) **PATIENTKORT**



Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning.
Detta kommer att göra det möjligt att snabbt
identifiera ny säkerhetsinformation.

Version: 1.0 | Godkänt: 29.12.2021

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Du kan också rapportera biverkningar för Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea webbplats:

www.fimea.fi

*Säkerhets- och utvecklingscentret för
läkemedelsområdet Fimea,
Biverkningsregistret,
PB 55,
00034 FIMEA*

eller

per telefon till Pfizer Oy (09-430 040).

Ditt namn:

Läkarens namn (som förskrivit Cibinqo):

Läkarens telefonnummer:

Datum då behandling med Cibinqo påbörjades:

Säkerhetsinformation till patienter om Cibinqo:

- Detta kort innehåller viktig säkerhetsinformation som du ska känna till – innan och under behandling med Cibinqo.
- För mer information, läs bipacksedeln som medföljer varje förpackning med Cibinqo.
- Fråga din läkare eller apotekspersonal om något i informationen känns otydligt.

Ha detta kort med dig och visa det för all hälso-och sjukvårdspersonal t. ex. apotekspersonal eller akutläkare som du behandlas av.

**Du bör känna till vissa biverkningar och informationen som anges nedan.
Tala med din läkare om du får några biverkningar:**

Risk för infektioner

Ta inte Cibiņo om du har en allvarlig infektion, inklusive tuberkulos.

Tala omedelbart om för din läkare om du:

- utvecklar symtom på en infektion, såsom feber, svettningar eller frossa, muskelvärk, hosta eller andfåddhet, blod i slemmet, viktninskning, diarré eller magont, sveda när du kissar eller att du måste kissa oftare än vanligt, känner dig mycket trött.
- utvecklar symtom på herpesinfektion (bältros), såsom smärtsamma hudutslag med blåsor.

- har eller har tidigare haft tuberkulos eller har varit i nära kontakt med någon person med tuberkulos

Vacciner

Tala med din läkare eller med apotekspersonal om du nyligen har vaccinerats eller planerar att vaccinera dig. Detta beror på att vacciner som innehåller levande försvagade sjukdomsalstrare (t. ex. vaccin mot tuberkulos och vaccin mot vattkoppor samt MPR-vaccin som skyddar mot mässling, röda hund och påssjuk) inte rekommenderas före och under behandling med Cibinqo.

Blodproppar i vener (som kallas djup ventrombos) eller lungor (som kallas lungemboli)

Tala omedelbart om för din läkare om:

- du har haft blodproppar i venerna i benen (djup ventrombos) eller i lungorna (lungemboli). Om du blir andfådd, får bröstsmärta eller smärta och svullnad i ett ben medan du tar Cibinqo, eftersom detta kan vara tecken på blodproppar i venerna.

Laboratorietester

Din läkare kommer att be dig göra laborietester (inklusive tester för högt kolesterolvärde) innan du

börjar ta Cibinqo och medan du tar Cibinqo. Läkaren kan behöva justera din behandling i enlighet med testresultaten.

Preventivmedel och graviditet

Cibinqo ska INTE användas under graviditet.

Om du är kvinna i fertil ålder ska du använda en effektiv preventivmetod under behandling med Cibinqo och i minst en månad efter din sista dos av Cibinqo. Tala med din läkare om lämpliga preventivmetoder.

Tala omedelbart om för din läkare om du blir gravid eller tror att du kan ha blivit gravid under behandlingen.

Version: 1.0 | Godkánt: 29.12.2021

PP-CIB-FIN-0004-16122021