

Idacio[®] potilaskortti

Tässä kortissa on tärkeitä turvallisuutta koskevia tietoja, joista sinun on oltava tietoinen ennen Idacio[®]-hoitoa ja sen aikana.

▼Tähän lääkkeeseen kohdistuu lisäseuranta. Tällä tavalla voidaan havaita nopeasti uutta turvallisuutta koskevaa tietoa. Voit auttaa ilmoittamalla kaikista mahdollisesti saamistasi haittavaikutuksista osoitteeseen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea, Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri, PL 55, 00034 FIMEA (www-sivusto: www.fimea.fi).

Idacio[®]

Tässä kortissa on tärkeitä turvallisuutta koskevia tietoja, joista sinun on oltava tietoinen ennen Idacio®-hoitoa ja sen aikana.

- Pidä tämä kortti mukanasasi aina ja vielä 70 päivän ajan viimeisen Idacio®-injektion jälkeen.
- Näytä tämä kortti kaikille terveydenhuollon ammattilaisille, joiden vastaanotolla käyt.
- Merkitse tehdyt tuberkuloositestit ja tuberkuloosiin mahdollisesti annettu hoito tämän kortin takasivulle.

Johdanto

IDACIO® on lääke, joka on tarkoitettu immuunijärjestelmän erääseen osaan vaikuttavien tiettyjen sairauksien hoitoon. Idacio® voi tehot näiden sairauksien hoitoon, mutta joillekin potilaille voi ilmetä yksi tai useita haittavaikutuksia. On tärkeää keskustella lääkärin kanssa Idacio®-hoidon mahdollisista hyödyistä ja mahdollisista haittavaikutuksista. Nämä voivat olla kullakin henkilöllä erilaisia.

- Tässä kortissa on tietoja joistakin Idacio®-hoidon haittavaikutuksista.
- Vakavia haittavaikutuksia voivat olla mm. infektiot, syöpä ja hermoston häiriöt. Idacio®-valmisteen mahdolliset haittavaikutukset eivät kuitenkaan rajoitu näihin.

Ennen Idacio®-hoitoa

Kerro lääkärille mahdollisista sairauksistasi ja mahdollisesti jo käyttämistäsi lääkkeitä, jotta voitte lääkärin kanssa päättää, sopiiko Idacio®-hoito sinulle.

Kerro lääkärille

- jos sinulla on jokin infektio tai infektion oireita (esim. kuumetta, haavoja, väsymystä tai hammasvaivoja)
- jos sinulla on tuberkuloosi tai olet ollut läheisessä kosketuksessa tuberkuloosia sairastavan henkilön kanssa
- jos sinulla on tai on aiemmin ollut syöpä
- jos sinulla on tunnottomuutta, kihelmöintiä tai jokin hermostoon vaikuttava sairaus, kuten MS-tauti (multippeliskleroosi).

Lääkärin pitää tutkia sinulta tuberkuloosin oireet ja siihen viittaavat merkit ennen Idacio®-hoidon aloittamista. Saat tarvita hoitoa tuberkuloosiin ennen Idacio®-hoidon aloittamista.

Rokotukset

- Sinulle voidaan antaa rokotuksia, mutta ei eläviä taudinaiheuttajia sisältäviä rokotteita.
- Jos saat Idacio®-hoitoa raskauden aikana, siitä on tärkeää kertoa lapsesi lääkärille, ennen kuin lapsesi saa mitään rokotuksia. Lapsellesi ei saa antaa eläviä taudinaiheuttajia sisältäviä rokotteita, esim. BCG-rokotetta (tuberkuloosia vastaan) 5 kuukauteen raskauden aikana viimeksi saamastasi Idacio®-injektiosta.

Idacio®-hoidon aikana

Jotta Idacio®-hoito vaikuttaa asianmukaisesti ja on sinulle turvallinen, käy lääkärissä säännöllisesti keskustelemassa voinnistasi.

Kerro lääkärille heti, jos voinnissasi tapahtuu muutoksia.

Pidä hoitava lääkäri ajan tasalla siitä, miten Idacio®-hoito vaikuttaa vointiisi.

- On tärkeää, että soitat heti hoitavalle lääkärille, jos huomaat epätavallisia oireita, jotta saat

varmasti viipymättä oikeanlaista hoitoa.

Näin myös haittavaikutusten pahenemisen todennäköisyys vähenee.

- Moni haittavaikutus, kuten infektiot, voidaan hoitaa, jos kerrot niistä heti lääkärille.
- Jos sinulla ilmenee jokin haittavaikutus, lääkäri päättää, jatketaanko Idacio®-hoitoasi vai lopetetaanko se. On tärkeää selvittää lääkärin kanssa, mikä sopii sinulle.

- Haittavaikutuksia voi ilmaantua viimeisen Idacio®-annoksen jälkeenkin, joten kerro oireista lääkärille. Haittavaikutuksia voi ilmaantua vielä 70 päivän ajan viimeisen Idacio®-injektion jälkeen.

Kerro lääkärille

- sinulla mahdollisesti ilmenevistä uusista sairauksista
- mahdollisesti käyttämistäsi uusista lääkkeitä
- sinulle mahdollisesti suunniteltavista leikkauksista tai toimenpiteistä.

Joillekin Idacio®-hoitoa saaville potilaille voi ilmaantua vakavia haittavaikutuksia, joita voivat olla:

Infektiot

- IDACIO® -valmistetta käytetään tiettyjen tulehdussairauksien hoitoon, sillä Idacio® estää immuunijärjestelmän erään osan toimintaa. Kyseinen immuunijärjestelmän osa kuitenkin osallistuu myös infektioiden torjumiseen. Tämä tarkoittaa, että Idacio®-hoidon seurauksena infektioiden puhkeaminen tai jo olemassa olevien infektioiden paheneminen voi olla todennäköisempää. Tällaisia infektiota voivat olla esimerkiksi vilustumistaudit tai vakavammat infektiot, kuten tuberkuloosi.

Syöpä

- Idacio® voi lisätä tietyntyyppisten syöpien kehittymisen riskiä.

Hermostosairaudet

- Joillekin Idacio®-hoitoa saaneille potilaille on ilmennyt hermostosairaus tai jo olemassa ollut hermostosairaus on pahentunut. Tällainen sairaus on esim. MS-tauti (multippeliskleroosi).

Lue tarkemmat tiedot Idacio®-valmisteen pakkausselosteesta. Tässä ei ole lueteltu kaikkia Idacio®-hoidon yhteydessä mahdollisesti esiintyviä haettavaikutuksia.

Soita lääkäriin tai hakeudu heti hoitoon, jos sinulla on seuraavia mahdollisesti vakavien haettavaikutusten oireita:

Infektiot

- kuume, vilunväristykset, epätavallinen hikoilu, huonovointisuus, tavanomaista voimakkaampi väsymys, pahoinvointi tai oksentelu, ripuli, mahakipu, ruokahaluttomuus tai laihtuminen, yskä tai veriset tai limaiset yskökset, hengenahdistus, virtsaamisvaikeudet, ihon haavaumat, haavat, lihassärky, hammasvaivat.

Syöpä

- yöhikoilu, kaulassa, kainaloissa, nivusissa tai muualla olevien imusolmukkeiden (rauhasien) turpoaminen, laihtuminen, ihovaurioiden (esim. luomien tai pisamien) ilmaantuminen tai ulkonäkömuutokset, voimakas kutina, jonka syytä ei tiedetä.

Hermostosairaudet

- tunnottomuus tai kihelmöinti, näkökyvyn muutokset, lihasheikkous, huimaus, jonka syytä ei tiedetä.

Kerro hoitavalta lääkäriin, jos sinulle ilmaantuu Idacio®-hoidon aikana epätavallisia oireita. Edellä ei ole mainittu kaikkia mahdollisia haettavaikutusten oireita.

Tietoja sinulle ja sinua hoitaville terveydenhuollon ammattilaisille

Tuberkuloositestit ja -hoidot

Rastita tämä ruutu, jos sinulta on joskus testattu tuberkuloosi:

- KYLLÄ (jos et tiedä, tarkista hoitavalta lääkäriin)

Rastita tämä ruutu, jos sinulla on joskus ollut positiivinen tuberkuloositestin tulos:

- KYLLÄ (jos et tiedä, tarkista hoitavalta lääkäriin)

Rastita tämä ruutu, jos olet joskus käyttänyt lääkkeitä tuberkuloosin hoitoon tai estohoitoon:

- KYLLÄ (jos et tiedä, tarkista hoitavalta lääkäriin)

Lue lisätietoja Idacio®-valmisteen pakkausselosteesta. Jos sinulla on kysyttävää, käänny hoitavan lääkäriin tai muun terveydenhuollon ammattilaisen puoleen.

Nimesi: _____

Lääkäriin nimi (Idacio®-hoidon määrännyt lääkäri):

Lääkäriin puhelinnumero:_____

Käyttöaihe:_____

Ensimmäisen Idacio®-injektion päivämäärä: _____

Idacio®-injektion annos: _____

Viimeisen Idacio®-injektion päivämäärä (jos et enää saa Idacio®-hoitoa): _____

Täytä omat tietosi ja sinua hoitavan lääkäriin tiedot.

Muistiinpanot (kommentteja tai kysymyksiä lääkäriin)

Fresenius Kabi Ab, sivuliike Suomessa
00520 Helsinki

Lisätietoja:

P: 09-4281 550

@: asiakaspalvelu@fresenius-kabi.com

BI430-11-2019-v02
hyväksytty 12/2019

