

# POTILASKORTTI

Tähän lääkkeeseen kohdistuu lisäseuranta. Tällä tavalla voidaan havaita nopeasti uutta turvallisuutta koskevaa tietoa. Voit auttaa ilmoittamalla kaikista mahdollisesti saamistasi haittavaikutuksista. Ks. [www.fimea.fi](http://www.fimea.fi) (Lääketurvallisuus ja -tieto), kuinka haittavaikutuksista ilmoitetaan.

- Tämä potilaskortti sisältää tärkeitä turvallisuuteen liittyviä tietoja, jotka sinun on tunnettava ennen Kevzara-hoidon aloittamista, hoidon aikana ja hoidon jälkeen. Kevzara-hoito annetaan pistoksena ihon alle (ihonalainen injektio).
- Näytä tämä kortti kaikille sinua hoitaville lääkäreille.
- Lue Kevzara-pakkausseloste huolellisesti saadaksesi lisätietoa ja käyttöön liittyviä ohjeita.

**Ota välittömästi yhteys lääkäriin**, jos saat oireita, kuten kuumetta, hikoilua, vilunväristyksiä, sitkeää yskää, painonlaskua, voimattomuutta tai vatsakipua, joka ei lähde pois.

Kevzara voi heikentää elimistösi kykyä vastustaa infektioita, mikä tekee sinut alttiimmaksi saamaan infektioita tai pahentaa sinulla jo olevaa infektiota.

- Keskustele lääkärin kanssa, jos sinulla on mikä tahansa infektio tai sinulle kehittyy paljon tai toistuvia infektoita.
- Keskustele lääkärin kanssa, jos olet äskettäin saanut tai aiot ottaa minkä tahansa rokotuksen.
- Ennen Kevzara-hoidon aloittamista lääkäri tarkistaa, ettei sinulla ole tuberkuloosia.
- Sinulle tehdään verikokeita ennen Kevzara-hoidon aloittamista ja hoidon aikana. Näin seurataan veresi valkosoluarvoja.

## KEVZARA-HOIDON TIEDOT

Pistettävä Kevzara-annos:

Aloituspvm.:



Potilaan  
nimi:



Lääkärin  
nimi:



Lääkärin  
puh.:

**Varmista, että mukanasasi on luettelo kaikista käyttämistäsi lääkkeistä aina, kun menet terveydenhuoltohenkilön vastaanotolle.**

**Pidä tämä kortti mukanasasi hoidon aikana ja 2 kuukauden ajan viimeisen Kevzara-annoksen jälkeen.** Haittavaikutuksia voi ilmaantua viiveellä viimeisen Kevzara-annoksen jälkeen.

SANOFI GENZYME



**REGENERON**