

# Potilaskortti

## Inflectra™ 100 mg

kuiva-aine välikonsentraatiksi  
infusionestettä varten, liuos

## infliksimabi



Fimean hyväksymispäivämäärä: 13.6.2022  
Versio: 5.0

Potilaan nimi:

Lääkärin nimi:

Lääkärin puhelinnumero:

*Kun aloitat uuden kortin, säilytäthän tämän kortin myöhempää tarvetta varten 4 kuukauden ajan viimeisen Inflectra-annoksesi jälkeen.*

**Inflectra-hoito aloitettu:**

**Annetut infuusiot:**

*On tärkeää, että sinä ja lääkäri merkitsette mui-  
tiin lääkkeesi kaupanimen ja eränumeron.*

**Kaupanimi:**

**Eränumero:**

*Pyydä lääkäriä merkitsemään tähän tiedot  
viimeisimmästä tuberkuloosiseulonasta:*

**Menetelmä:**

**Menetelmä:**

**Päiväys:**

**Päiväys:**

**Tulos:**

**Tulos:**

*Varmista, että sinulla on mukana luettelo  
kaikista muista käyttämistäsi lääkkeistä,  
kun menet vastaanotolle.*

**Luettelo muista käytössä olevista lääkkeistä:**

**Allergiat:**

## Näytä tämä kortti kaikille hoitoosi osallistuville lääkäreille.

Tämä potilaskortti sisältää tärkeää turvallisuuteen liittyvää tietoa, josta sinun on hyvä olla tietoinen ennen Inflectra-hoidon aloitusta ja sen aikana.

Lue Inflectra-valmisteen pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen.

## Infektiot

### Ennen Inflectra-hoitoa

- Kerro lääkärille, jos sinulla on jokin infektio, vaikka se olisi hyvin vähäinenkin.
- On erittäin tärkeää, että kerrot lääkärille, jos sinulla on joskus ollut tuberkuloosi tai jos olet joskus ollut läheisessä kontaktissa henkilön kanssa, jolla on ollut tuberkuloosi. Sinulle tehdään tuberkuloosin seulontakokeet. Pyydä, että lääkäri merkitsee tiedot seulontakokeista tähän korttiin.

- Kerro lääkärille, jos sinulla on B-hepatiitti tai jos tiedät tai epäilet olevasi B-hepatiittiviruksen kantaja.

### Inflectra-hoidon aikana

- Kerro heti lääkärille, jos sinulle ilmaantuu infektio-oireita, kuten kuumetta, väsymystä, (itsepintaista) yskää, hengenahdistusta, painon alenemista, yöhikoilua, ripulia, haavau-mia, hampasongelmia, kirvelyä virtsa-tessa tai flunssan kaltaisia oireita.

### Raskaus, imetys ja rokotukset

- Jos olet saanut Inflectra-valmistetta raskauden aikana tai jos imetät, on tärkeää että kerrot siitä lastasi hoitavalle lääkärille, ennen kuin lapsesi saa mitään rokotuksia. Lapsellesi ei saa antaa ”elävää rokotetta”, kuten BCG-rokotetta (käytetään tuberkuloosin ehkäisyyn) 12 kuukauteen syntymän jälkeen tai imetyksen aikana ellei lastasi hoitava lääkäri toisin suosittele.

Pidä tämä kortti mukanasasi 4 kuukauden ajan Inflectra-annoksen jälkeen, tai jos olet raskaana, vähintään 12 kuukauden ajan synnytyksen jälkeen. Haittavaikutuksia voi ilmaantua pitkänkin ajan kuluttua viimeisestä annoksesta.

### Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskukseen Fimeaan, Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri, PL 55, FI-00034 Fimea  
www-sivusto: [www.fimea.fi](http://www.fimea.fi)  
(Haittavaikutuksista ilmoittaminen) tai Pfizer Oy:n puhelinvaihteen (09-430 040) kautta.