

Patientkort

Inflectra™ 100 mg

pulver till koncentrat till
infusionsvätska, lösning

infiximab



Fimeas godkännande: 13.6.2022
Version: 5.0

Namn patient:

Namn läkare:

Telefonnummer, läkare:

När du börjar på ett nytt kort ska du spara det här kortet som referens i 4 månader efter din sista dos av Inflectra.

Datum för påbörjad behandling med Inflectra:

Senaste behandlingar:

Det är viktigt att du och din läkare skriver ned produktnamnet och tillverknings satsnummer på ditt läkemedel.

Produktnamn:

Tillverknings satsnummer:

Be din läkare att notera typ och datum för senaste tuberkulosundersökning:

Undersökning:

Undersökning:

Datum:

Datum:

Resultat:

Resultat:

Se till att du alltid tar med en lista över alla andra läkemedel som du använder vid varje besök till hälso- och sjukvårdspersonal.

Lista över andra läkemedel:

Lista över allergier:

Visa detta kort vid varje tillfälle som du besöker läkare.

Detta patientkort innehåller viktig säkerhetsinformation som du behöver känna till innan och under behandlingen med Inflectra.

Läs noga Inflectra bipacksedel i förpackningen innan du börjar använda detta läkemedel.

Infektioner

Före behandling med Inflectra

- Tala om för din läkare om du har en infektion, även en lindring sådan.
- Det är mycket viktigt att du talar om för din läkare om du någonsin har haft tuberkulos (TBC) eller om du har varit i nära kontakt med någon som har haft tuberkulos. Din läkare kommer att undersöka om du har tuberkulos. Be din läkare att notera typ och datum för senaste tuberkulosundersökning på kortet.

- Tala om för din läkare om du har hepatit B eller om du vet eller misstänker att du är bärare av hepatit B-virus.

Under behandling med Inflectra

- Tala omedelbart om för din läkare om du har tecken på en infektion. Sådana tecken omfattar feber, trötthetskänsla, (ihållande) hosta, andfåddhet, viktnedgång, nattliga svettningar, diarré, sår, tandbesvär, sveda vid urinering eller influensaliknande symtom.

Graviditet, amning och vaccinationer

- Om du har fått Inflectra under din graviditet eller du ammar, är det viktigt att du informerar ditt barns läkare om detta innan ditt barn får något vaccin. Ditt barn ska inte få "levande vacciner", såsom BCG (används för att förhindra tuberkulos) inom 12 månader efter födseln eller medan du ammar, om inte ditt barns läkare rekommenderar något annat.

Ha alltid med dig detta kort i 4 månader efter din Inflectrados, eller i händelse av graviditet i minst 12 månader efter ditt barns födelse. Biverkningar kan uppträda långt efter sista dosen.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Du kan också rapportera biverkningar för Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea, Biverkningsregistret, PB 55, 00034 FIMEA
webbplats: www.fimea.fi
(Rapportering av biverkningar) eller per telefon till Pfizer Oy (09-430 040).