

Fabrazyme®-koti- infuusioiden hoitopäiväkirja



Tässä oppaassa esitetyt menettelytavat ovat yleisiä ohjeita. Paikallisia hoitokäytäntöjä ja määräyksiä on noudatettava.

Yhteystiedot (hoitava lääkäri täyttää)

Hätänumero:

Potilas	
Nimi:	
Syntymäaika:	
Osoite:	
Postinumero/ kaupunki:	
Puhelin:	

Potilaan hoitaja/huoltaja	
Nimi:	
Osoite:	
Postinumero/ kaupunki:	
Puhelin:	

Apteekki	
Nimi:	
Osoite:	
Postinumero/ kaupunki:	
Puhelin:	

Hoitava lääkäri	
Nimi:	
Sairaala:	
Osoite:	
Postinumero/ kaupunki:	
Puhelin:	
Hätänumero:	

Sairaanhoitaja	
Nimi:	
Toimipaikka:	
Osoite:	
Postinumero/ kaupunki:	
Puhelin:	

Antotiedot (hoitava lääkäri täyttää)

Fabrazyme-valmisteen käyttö aloitettiin:	Päivämäärä (pp-kk-vvvv):
Ensimmäinen koti-infuusio:	Päivämäärä (pp-kk-vvvv):

Fabrazyme-annosaikataulu

Annos:	
Tiheys:	
Infuusionopeus:	
Tarvittava käyttövalmiin injektioiuoksen määrä (ml):	
Kokonaismäärä infuusiopussissa (ml):	
Esilääkitys: (tarvittaessa)	
Fabrazyme-koti-infuusion syyt:	
Aloitushaastattelun löydökset ja toimenpiteet:	
Ilmoita infuusioista vastaavan sairaanhoitajan antama tuki kotona:	

Tarvittavat toimet vakavan infuusion liittyvän reaktion ilmetessä

(hoitava lääkäri täyttää)

1. Lopeta infuusio

2. Soita kansalliseen hätänumeroon

Puhelin:

3. Soita hoitavalle lääkärille

Puhelinnumero:

Puhelinnumero (24 h):

Lääkärin nimi:

Toimipaikan nimi:

Osoite:

4. Ensiapuläkkeet

Läkkeet ja annokset:

5. Potilaan yhteyshenkilö hätätilanteessa

Nimi:

Puhelinnumero:

Tämä lomake on täytettävä jokaisesta infuusiotapahtumasta

- Potilaalle ja/tai huoltajalle/hoitajalle on ilmoitettu Fabrazyme-koti-infuusioihin liittyvistä vaaroista, ja heille on annettu tarvittavaa koulutusta ensiapulääkkeiden käytöstä.
- Mikäli potilaalla ilmenee infuusion liittyvä reaktio, **infuusio on keskeytettävä välittömästi**.
- Tarpeelliset toimenpiteet vakavan infuusion liittyvän reaktion ilmetessä, **sisältäen hätätilanneyhteyshenkilön tiedot**, on kuvattu hoitopäiväkirjassa. Nämä tiedot on pidettävä saatavilla infuusion annon aikana.

Annos	
Tarvittava käyttövalmiin injektioliuoksen määrä (ml):	
Käytettyjen injektioipullojen määrä:	5 mg:n injektioipullot:
	35 mg:n injektioipullot:
Infuusion annon kesto:	
Antonopeus:	
Infuusion liittyvät ongelmat/huomautukset (mukaan lukien infuusion liittyvät reaktiot, suoritettut toimenpiteet ja tulos):	
Potilaan yleinen terveydentila – kuvaa kaikki uudet terveysongelmat, joita sinulla parhaillaan ilmenee ennen infuusiota, jos sellaisia on:	

5. Infuusiosta vastaavan henkilön nimi	
Infuusiopäivämäärä:	(PP-KK-VVVV):
Sairaanhoitaja:	
Hoitaja/huoltaja (jos eri kuin yllä):	

Tämä lomake on täytettävä jokaisesta infuusiotapahtumasta

- Potilaalle ja/tai huoltajalle/hoitajalle on ilmoitettu Fabrazyme-koti-infuusioihin liittyvistä vaaroista, ja heille on annettu tarvittavaa koulutusta ensiapulääkkeiden käytöstä.
- Mikäli potilaalla ilmenee infuusioon liittyvä reaktio, **infuusio on keskeytettävä välittömästi**.
- Tarpeelliset toimenpiteet vakavan infuusion liittyvän reaktion ilmetessä, **sisältäen hätätilanneyhteyshenkilön tiedot**, on kuvattu hoitopäiväkirjassa. Nämä tiedot on pidettävä saatavilla infuusion annon aikana.

Annos	
Tarvittava käyttövalmiin injektioliuoksen määrä (ml):	
Käytettyjen injektioipullojen määrä:	5 mg:n injektioipullot:
	35 mg:n injektioipullot:
Infuusion annon kesto:	
Antonopeus:	
Infuusioon liittyvät ongelmat/huomautukset (mukaan lukien infuusioon liittyvät reaktiot, suoritettut toimenpiteet ja tulos):	
Potilaan yleinen terveydentila – kuvaa kaikki uudet terveysongelmat, joita sinulla parhaillaan ilmenee ennen infuusiota, jos sellaisia on:	

5. Infuusiosta vastaavan henkilön nimi	
Infuusiopäivämäärä:	(PP-KK-VVVV):
Sairaanhoitaja:	
Hoitaja/huoltaja (jos eri kuin yllä):	

Tämä lomake on täytettävä jokaisesta infuusiotapahtumasta

- Potilaalle ja/tai huoltajalle/hoitajalle on ilmoitettu Fabrazyme-koti-infuusioihin liittyvistä vaaroista, ja heille on annettu tarvittavaa koulutusta ensiapulääkkeiden käytöstä.
- Mikäli potilaalla ilmenee infuusion liittyvä reaktio, **infuusio on keskeytettävä välittömästi**.
- Tarpeelliset toimenpiteet vakavan infuusion liittyvän reaktion ilmetessä, **sisältäen hätätilanneyhteyshenkilön tiedot**, on kuvattu hoitopäiväkirjassa. Nämä tiedot on pidettävä saatavilla infuusion annon aikana.

Annos	
Tarvittava käyttövalmiin injektioliuoksen määrä (ml):	
Käytettyjen injektioipullojen määrä:	5 mg:n injektioipullot:
	35 mg:n injektioipullot:
Infuusion annon kesto:	
Antonopeus:	
Infuusion liittyvät ongelmat/huomautukset (mukaan lukien infuusion liittyvät reaktiot, suoritettut toimenpiteet ja tulos):	
Potilaan yleinen terveydentila – kuvaa kaikki uudet terveysongelmat, joita sinulla parhaillaan ilmenee ennen infuusiota, jos sellaisia on:	

5. Infuusiosta vastaavan henkilön nimi	
Infuusiopäivämäärä:	(PP-KK-VVVV):
Sairaanhoitaja:	
Hoitaja/huoltaja (jos eri kuin yllä):	

Tämä lomake on täytettävä jokaisesta infuusiotapahtumasta

- Potilaalle ja/tai huoltajalle/hoitajalle on ilmoitettu Fabrazyme-koti-infuusioihin liittyvistä vaaroista, ja heille on annettu tarvittavaa koulutusta ensiapulääkkeiden käytöstä.
- Mikäli potilaalla ilmenee infuusion liittyvä reaktio, **infuusio on keskeytettävä välittömästi**.
- Tarpeelliset toimenpiteet vakavan infuusion liittyvän reaktion ilmetessä, **sisältäen hätätilanneyhteyshenkilön tiedot**, on kuvattu hoitopäiväkirjassa. Nämä tiedot on pidettävä saatavilla infuusion annon aikana.

Annos	
Tarvittava käyttövalmiin injektioliuoksen määrä (ml):	
Käytettyjen injektioipullojen määrä:	5 mg:n injektioipullot:
	35 mg:n injektioipullot:
Infuusion annon kesto:	
Antonopeus:	
Infuusion liittyvät ongelmat/huomautukset (mukaan lukien infuusion liittyvät reaktiot, suoritettut toimenpiteet ja tulos):	
Potilaan yleinen terveydentila – kuvaa kaikki uudet terveysongelmat, joita sinulla parhaillaan ilmenee ennen infuusiota, jos sellaisia on:	

5. Infuusiosta vastaavan henkilön nimi	
Infuusiopäivämäärä:	(PP-KK-VVVV):
Sairaanhoitaja:	
Hoitaja/huoltaja (jos eri kuin yllä):	

Tämä lomake on täytettävä jokaisesta infuusiotapahtumasta

- Potilaalle ja/tai huoltajalle/hoitajalle on ilmoitettu Fabrazyme-koti-infuusioihin liittyvistä vaaroista, ja heille on annettu tarvittavaa koulutusta ensiapulääkkeiden käytöstä.
- Mikäli potilaalla ilmenee infuusioon liittyvä reaktio, **infuusio on keskeytettävä välittömästi**.
- Tarpeelliset toimenpiteet vakavan infuusioon liittyvän reaktion ilmetessä, **sisältäen hätätilanneyhteyshenkilön tiedot**, on kuvattu hoitopäiväkirjassa. Nämä tiedot on pidettävä saatavilla infuusion annon aikana.

Annos	
Tarvittava käyttövalmiin injektioliuoksen määrä (ml):	
Käytettyjen injektioipullojen määrä:	5 mg:n injektioipullot:
	35 mg:n injektioipullot:
Infuusion annon kesto:	
Antonopeus:	
Infuusioon liittyvät ongelmat/huomautukset (mukaan lukien infuusioon liittyvät reaktiot, suoritettut toimenpiteet ja tulos):	
Potilaan yleinen terveydentila – kuvaa kaikki uudet terveysongelmat, joita sinulla parhaillaan ilmenee ennen infuusiota, jos sellaisia on:	

5. Infuusiosta vastaavan henkilön nimi	
Infuusiopäivämäärä:	(PP-KK-VVVV):
Sairaanhoitaja:	
Hoitaja/huoltaja (jos eri kuin yllä):	

Tämä lomake on täytettävä jokaisesta infuusiotapahtumasta

- Potilaalle ja/tai huoltajalle/hoitajalle on ilmoitettu Fabrazyme-koti-infuusioihin liittyvistä vaaroista, ja heille on annettu tarvittavaa koulutusta ensiapulääkkeiden käytöstä.
- Mikäli potilaalla ilmenee infuusioon liittyvä reaktio, **infuusio on keskeytettävä välittömästi**.
- Tarpeelliset toimenpiteet vakavan infuusioon liittyvän reaktion ilmetessä, **sisältäen hätätilanneyhteyshenkilön tiedot**, on kuvattu hoitopäiväkirjassa. Nämä tiedot on pidettävä saatavilla infuusion annon aikana.

Annos	
Tarvittava käyttövalmiin injektioliuoksen määrä (ml):	
Käytettyjen injektioipullojen määrä:	5 mg:n injektioipullot:
	35 mg:n injektioipullot:
Infuusion annon kesto:	
Antonopeus:	
Infuusioon liittyvät ongelmat/huomautukset (mukaan lukien infuusioon liittyvät reaktiot, suoritettut toimenpiteet ja tulos):	
Potilaan yleinen terveydentila – kuvaa kaikki uudet terveysongelmat, joita sinulla parhaillaan ilmenee ennen infuusiota, jos sellaisia on:	

5. Infuusiosta vastaavan henkilön nimi	
Infuusiopäivämäärä:	(PP-KK-VVVV):
Sairaanhoidtaja:	
Hoitaja/huoltaja (jos eri kuin yllä):	

Tämä lomake on täytettävä jokaisesta infuusiotapahtumasta

- Potilaalle ja/tai huoltajalle/hoitajalle on ilmoitettu Fabrazyme-koti-infuusioihin liittyvistä vaaroista, ja heille on annettu tarvittavaa koulutusta ensiapulääkkeiden käytöstä.
- Mikäli potilaalla ilmenee infuusion liittyvä reaktio, **infuusio on keskeytettävä välittömästi**.
- Tarpeelliset toimenpiteet vakavan infuusion liittyvän reaktion ilmetessä, **sisältäen hätätilanneyhteyshenkilön tiedot**, on kuvattu hoitopäiväkirjassa. Nämä tiedot on pidettävä saatavilla infuusion annon aikana.

Annos	
Tarvittava käyttövalmiin injektioliuoksen määrä (ml):	
Käytettyjen injektioipullojen määrä:	5 mg:n injektioipullot:
	35 mg:n injektioipullot:
Infuusion annon kesto:	
Antonopeus:	
Infuusion liittyvät ongelmat/huomautukset (mukaan lukien infuusion liittyvät reaktiot, suoritettut toimenpiteet ja tulos):	
Potilaan yleinen terveydentila – kuvaa kaikki uudet terveysongelmat, joita sinulla parhaillaan ilmenee ennen infuusiota, jos sellaisia on:	

5. Infuusiosta vastaavan henkilön nimi	
Infuusiopäivämäärä:	(PP-KK-VVVV):
Sairaanhoitaja:	
Hoitaja/huoltaja (jos eri kuin yllä):	

Tämä lomake on täytettävä jokaisesta infuusiotapahtumasta

- Potilaalle ja/tai huoltajalle/hoitajalle on ilmoitettu Fabrazyme-koti-infuusioihin liittyvistä vaaroista, ja heille on annettu tarvittavaa koulutusta ensiapulääkkeiden käytöstä.
- Mikäli potilaalla ilmenee infuusion liittyvä reaktio, **infuusio on keskeytettävä välittömästi**.
- Tarpeelliset toimenpiteet vakavan infuusion liittyvän reaktion ilmetessä, **sisältäen hätätilanneyhteyshenkilön tiedot**, on kuvattu hoitopäiväkirjassa. Nämä tiedot on pidettävä saatavilla infuusion annon aikana.

Annos	
Tarvittava käyttövalmiin injektioliuoksen määrä (ml):	
Käytettyjen injektioipullojen määrä:	5 mg:n injektioipullot:
	35 mg:n injektioipullot:
Infuusion annon kesto:	
Antonopeus:	
Infuusion liittyvät ongelmat/huomautukset (mukaan lukien infuusion liittyvät reaktiot, suoritettut toimenpiteet ja tulos):	
Potilaan yleinen terveydentila – kuvaa kaikki uudet terveysongelmat, joita sinulla parhaillaan ilmenee ennen infuusiota, jos sellaisia on:	

5. Infuusiosta vastaavan henkilön nimi	
Infuusiopäivämäärä:	(PP-KK-VVVV):
Sairaanhoitaja:	
Hoitaja/huoltaja (jos eri kuin yllä):	

Tämä lomake on täytettävä jokaisesta infuusiotapahtumasta

- Potilaalle ja/tai huoltajalle/hoitajalle on ilmoitettu Fabrazyme-koti-infuusioihin liittyvistä vaaroista, ja heille on annettu tarvittavaa koulutusta ensiapulääkkeiden käytöstä.
- Mikäli potilaalla ilmenee infuusion liittyvä reaktio, **infuusio on keskeytettävä välittömästi**.
- Tarpeelliset toimenpiteet vakavan infuusion liittyvän reaktion ilmetessä, **sisältäen hätätilanneyhteyshenkilön tiedot**, on kuvattu hoitopäiväkirjassa. Nämä tiedot on pidettävä saatavilla infuusion annon aikana.

Annos	
Tarvittava käyttövalmiin injektioliuoksen määrä (ml):	
Käytettyjen injektioipullojen määrä:	5 mg:n injektioipullot:
	35 mg:n injektioipullot:
Infuusion annon kesto:	
Antonopeus:	
Infuusion liittyvät ongelmat/huomautukset (mukaan lukien infuusion liittyvät reaktiot, suoritettut toimenpiteet ja tulos):	
Potilaan yleinen terveydentila – kuvaa kaikki uudet terveysongelmat, joita sinulla parhaillaan ilmenee ennen infuusiota, jos sellaisia on:	

5. Infuusiosta vastaavan henkilön nimi	
Infuusiopäivämäärä:	(PP-KK-VVVV):
Sairaanhoitaja:	
Hoitaja/huoltaja (jos eri kuin yllä):	

Tämä lomake on täytettävä jokaisesta infuusiotapahtumasta

- Potilaalle ja/tai huoltajalle/hoitajalle on ilmoitettu Fabrazyme-koti-infuusioihin liittyvistä vaaroista, ja heille on annettu tarvittavaa koulutusta ensiapulääkkeiden käytöstä.
- Mikäli potilaalla ilmenee infuusioon liittyvä reaktio, **infuusio on keskeytettävä välittömästi**.
- Tarpeelliset toimenpiteet vakavan infuusion liittyvän reaktion ilmetessä, **sisältäen hätätilanneyhteyshenkilön tiedot**, on kuvattu hoitopäiväkirjassa. Nämä tiedot on pidettävä saatavilla infuusion annon aikana.

Annos	
Tarvittava käyttövalmiin injektioliuoksen määrä (ml):	
Käytettyjen injektioipullojen määrä:	5 mg:n injektioipullot:
	35 mg:n injektioipullot:
Infuusion annon kesto:	
Antonopeus:	
Infuusioon liittyvät ongelmat/huomautukset (mukaan lukien infuusioon liittyvät reaktiot, suoritettut toimenpiteet ja tulos):	
Potilaan yleinen terveydentila – kuvaa kaikki uudet terveysongelmat, joita sinulla parhaillaan ilmenee ennen infuusiota, jos sellaisia on:	

5. Infuusiosta vastaavan henkilön nimi	
Infuusiopäivämäärä:	(PP-KK-VVVV):
Sairaanhoitaja:	
Hoitaja/huoltaja (jos eri kuin yllä):	

Tämä lomake on täytettävä jokaisesta infuusiotapahtumasta

- Potilaalle ja/tai huoltajalle/hoitajalle on ilmoitettu Fabrazyme-koti-infuusioihin liittyvistä vaaroista, ja heille on annettu tarvittavaa koulutusta ensiapulääkkeiden käytöstä.
- Mikäli potilaalla ilmenee infuusion liittyvä reaktio, **infuusio on keskeytettävä välittömästi**.
- Tarpeelliset toimenpiteet vakavan infuusion liittyvän reaktion ilmetessä, **sisältäen hätätilanneyhteyshenkilön tiedot**, on kuvattu hoitopäiväkirjassa. Nämä tiedot on pidettävä saatavilla infuusion annon aikana.

Annos	
Tarvittava käyttövalmiin injektioliuoksen määrä (ml):	
Käytettyjen injektioipullojen määrä:	5 mg:n injektioipullot:
	35 mg:n injektioipullot:
Infuusion annon kesto:	
Antonopeus:	
Infuusion liittyvät ongelmat/huomautukset (mukaan lukien infuusion liittyvät reaktiot, suoritettut toimenpiteet ja tulos):	
Potilaan yleinen terveydentila – kuvaa kaikki uudet terveysongelmat, joita sinulla parhaillaan ilmenee ennen infuusiota, jos sellaisia on:	

5. Infuusiosta vastaavan henkilön nimi	
Infuusiopäivämäärä:	(PP-KK-VVVV):
Sairaanhoitaja:	
Hoitaja/huoltaja (jos eri kuin yllä):	

Tämä lomake on täytettävä jokaisesta infuusiotapahtumasta

- Potilaalle ja/tai huoltajalle/hoitajalle on ilmoitettu Fabrazyme-koti-infuusioihin liittyvistä vaaroista, ja heille on annettu tarvittavaa koulutusta ensiapulääkkeiden käytöstä.
- Mikäli potilaalla ilmenee infuusioon liittyvä reaktio, **infuusio on keskeytettävä välittömästi**.
- Tarpeelliset toimenpiteet vakavan infuusioon liittyvän reaktion ilmetessä, **sisältäen hätätilanneyhteyshenkilön tiedot**, on kuvattu hoitopäiväkirjassa. Nämä tiedot on pidettävä saatavilla infuusion annon aikana.

Annos	
Tarvittava käyttövalmiin injektioliuoksen määrä (ml):	
Käytettyjen injektioipullojen määrä:	5 mg:n injektioipullot:
	35 mg:n injektioipullot:
Infuusion annon kesto:	
Antonopeus:	
Infuusioon liittyvät ongelmat/huomautukset (mukaan lukien infuusioon liittyvät reaktiot, suoritettut toimenpiteet ja tulos):	
Potilaan yleinen terveydentila – kuvaa kaikki uudet terveysongelmat, joita sinulla parhaillaan ilmenee ennen infuusiota, jos sellaisia on:	

5. Infuusiosta vastaavan henkilön nimi	
Infuusiopäivämäärä:	(PP-KK-VVVV):
Sairaanhoitaja:	
Hoitaja/huoltaja (jos eri kuin yllä):	

Tämä lomake on täytettävä jokaisesta infuusiotapahtumasta

- Potilaalle ja/tai huoltajalle/hoitajalle on ilmoitettu Fabrazyme-koti-infuusioihin liittyvistä vaaroista, ja heille on annettu tarvittavaa koulutusta ensiapulääkkeiden käytöstä.
- Mikäli potilaalla ilmenee infuusion liittyvä reaktio, **infuusio on keskeytettävä välittömästi**.
- Tarpeelliset toimenpiteet vakavan infuusion liittyvän reaktion ilmetessä, **sisältäen hätätilanneyhteyshenkilön tiedot**, on kuvattu hoitopäiväkirjassa. Nämä tiedot on pidettävä saatavilla infuusion annon aikana.

Annos	
Tarvittava käyttövalmiin injektioliuoksen määrä (ml):	
Käytettyjen injektioipullojen määrä:	5 mg:n injektioipullot:
	35 mg:n injektioipullot:
Infuusion annon kesto:	
Antonopeus:	
Infuusion liittyvät ongelmat/huomautukset (mukaan lukien infuusion liittyvät reaktiot, suoritettut toimenpiteet ja tulos):	
Potilaan yleinen terveydentila – kuvaa kaikki uudet terveysongelmat, joita sinulla parhaillaan ilmenee ennen infuusiota, jos sellaisia on:	

5. Infuusiosta vastaavan henkilön nimi	
Infuusiopäivämäärä:	(PP-KK-VVVV):
Sairaanhoitaja:	
Hoitaja/huoltaja (jos eri kuin yllä):	

Tämä lomake on täytettävä jokaisesta infuusiotapahtumasta

- Potilaalle ja/tai huoltajalle/hoitajalle on ilmoitettu Fabrazyme-koti-infuusioihin liittyvistä vaaroista, ja heille on annettu tarvittavaa koulutusta ensiapulääkkeiden käytöstä.
- Mikäli potilaalla ilmenee infuusion liittyvä reaktio, **infuusio on keskeytettävä välittömästi**.
- Tarpeelliset toimenpiteet vakavan infuusion liittyvän reaktion ilmetessä, **sisältäen hätätilanneyhteyshenkilön tiedot**, on kuvattu hoitopäiväkirjassa. Nämä tiedot on pidettävä saatavilla infuusion annon aikana.

Annos	
Tarvittava käyttövalmiin injektioliuoksen määrä (ml):	
Käytettyjen injektioipullojen määrä:	5 mg:n injektioipullot:
	35 mg:n injektioipullot:
Infuusion annon kesto:	
Antonopeus:	
Infuusion liittyvät ongelmat/huomautukset (mukaan lukien infuusion liittyvät reaktiot, suoritettut toimenpiteet ja tulos):	
Potilaan yleinen terveydentila – kuvaa kaikki uudet terveysongelmat, joita sinulla parhaillaan ilmenee ennen infuusiota, jos sellaisia on:	

5. Infuusiosta vastaavan henkilön nimi	
Infuusiopäivämäärä:	(PP-KK-VVVV):
Sairaanhoitaja:	
Hoitaja/huoltaja (jos eri kuin yllä):	

Tämä lomake on täytettävä jokaisesta infuusiotapahtumasta

- Potilaalle ja/tai huoltajalle/hoitajalle on ilmoitettu Fabrazyme-koti-infuusioihin liittyvistä vaaroista, ja heille on annettu tarvittavaa koulutusta ensiapulääkkeiden käytöstä.
- Mikäli potilaalla ilmenee infuusion liittyvä reaktio, **infuusio on keskeytettävä välittömästi**.
- Tarpeelliset toimenpiteet vakavan infuusion liittyvän reaktion ilmetessä, **sisältäen hätätilanneyhteyshenkilön tiedot**, on kuvattu hoitopäiväkirjassa. Nämä tiedot on pidettävä saatavilla infuusion annon aikana.

Annos	
Tarvittava käyttövalmiin injektioliuoksen määrä (ml):	
Käytettyjen injektioipullojen määrä:	5 mg:n injektioipullot:
	35 mg:n injektioipullot:
Infuusion annon kesto:	
Antonopeus:	
Infuusion liittyvät ongelmat/huomautukset (mukaan lukien infuusion liittyvät reaktiot, suoritettut toimenpiteet ja tulos):	
Potilaan yleinen terveydentila – kuvaa kaikki uudet terveysongelmat, joita sinulla parhaillaan ilmenee ennen infuusiota, jos sellaisia on:	

5. Infuusiosta vastaavan henkilön nimi	
Infuusiopäivämäärä:	(PP-KK-VVVV):
Sairaanhoitaja:	
Hoitaja/huoltaja (jos eri kuin yllä):	

Tämä lomake on täytettävä jokaisesta infuusiotapahtumasta

- Potilaalle ja/tai huoltajalle/hoitajalle on ilmoitettu Fabrazyme-koti-infuusioihin liittyvistä vaaroista, ja heille on annettu tarvittavaa koulutusta ensiapulääkkeiden käytöstä.
- Mikäli potilaalla ilmenee infuusion liittyvä reaktio, **infuusio on keskeytettävä välittömästi**.
- Tarpeelliset toimenpiteet vakavan infuusion liittyvän reaktion ilmetessä, **sisältäen hätätilanneyhteyshenkilön tiedot**, on kuvattu hoitopäiväkirjassa. Nämä tiedot on pidettävä saatavilla infuusion annon aikana.

Annos	
Tarvittava käyttövalmiin injektioliuoksen määrä (ml):	
Käytettyjen injektioipullojen määrä:	5 mg:n injektioipullot:
	35 mg:n injektioipullot:
Infuusion annon kesto:	
Antonopeus:	
Infuusion liittyvät ongelmat/huomautukset (mukaan lukien infuusion liittyvät reaktiot, suoritettut toimenpiteet ja tulos):	
Potilaan yleinen terveydentila – kuvaa kaikki uudet terveysongelmat, joita sinulla parhaillaan ilmenee ennen infuusiota, jos sellaisia on:	

5. Infuusiosta vastaavan henkilön nimi	
Infuusiopäivämäärä:	(PP-KK-VVVV):
Sairaanhoitaja:	
Hoitaja/huoltaja (jos eri kuin yllä):	

Tämä lomake on täytettävä jokaisesta infuusiotapahtumasta

- Potilaalle ja/tai huoltajalle/hoitajalle on ilmoitettu Fabrazyme-koti-infuusioihin liittyvistä vaaroista, ja heille on annettu tarvittavaa koulutusta ensiapulääkkeiden käytöstä.
- Mikäli potilaalla ilmenee infuusioon liittyvä reaktio, **infuusio on keskeytettävä välittömästi**.
- Tarpeelliset toimenpiteet vakavan infuusion liittyvän reaktion ilmetessä, **sisältäen hätätilanneyhteyshenkilön tiedot**, on kuvattu hoitopäiväkirjassa. Nämä tiedot on pidettävä saatavilla infuusion annon aikana.

Annos	
Tarvittava käyttövalmiin injektioliuoksen määrä (ml):	
Käytettyjen injektioipullojen määrä:	5 mg:n injektioipullot:
	35 mg:n injektioipullot:
Infuusion annon kesto:	
Antonopeus:	
Infuusioon liittyvät ongelmat/huomautukset (mukaan lukien infuusioon liittyvät reaktiot, suoritettut toimenpiteet ja tulos):	
Potilaan yleinen terveydentila – kuvaa kaikki uudet terveysongelmat, joita sinulla parhaillaan ilmenee ennen infuusiota, jos sellaisia on:	

5. Infuusiosta vastaavan henkilön nimi	
Infuusiopäivämäärä:	(PP-KK-VVVV):
Sairaanhoitaja:	
Hoitaja/huoltaja (jos eri kuin yllä):	

Tämä lomake on täytettävä jokaisesta infuusiotapahtumasta

- Potilaalle ja/tai huoltajalle/hoitajalle on ilmoitettu Fabrazyme-koti-infuusioihin liittyvistä vaaroista, ja heille on annettu tarvittavaa koulutusta ensiapulääkkeiden käytöstä.
- Mikäli potilaalla ilmenee infuusioon liittyvä reaktio, **infuusio on keskeytettävä välittömästi**.
- Tarpeelliset toimenpiteet vakavan infuusioon liittyvän reaktion ilmetessä, **sisältäen hätätilanneyhteyshenkilön tiedot**, on kuvattu hoitopäiväkirjassa. Nämä tiedot on pidettävä saatavilla infuusion annon aikana.

Annos	
Tarvittava käyttövalmiin injektioliuoksen määrä (ml):	
Käytettyjen injektioipullojen määrä:	5 mg:n injektioipullot:
	35 mg:n injektioipullot:
Infuusion annon kesto:	
Antonopeus:	
Infuusioon liittyvät ongelmat/huomautukset (mukaan lukien infuusioon liittyvät reaktiot, suoritettut toimenpiteet ja tulos):	
Potilaan yleinen terveydentila – kuvaa kaikki uudet terveysongelmat, joita sinulla parhaillaan ilmenee ennen infuusiota, jos sellaisia on:	

5. Infuusiosta vastaavan henkilön nimi	
Infuusiopäivämäärä:	(PP-KK-VVVV):
Sairaanhoitaja:	
Hoitaja/huoltaja (jos eri kuin yllä):	

Tämä lomake on täytettävä jokaisesta infuusiotapahtumasta

- Potilaalle ja/tai huoltajalle/hoitajalle on ilmoitettu Fabrazyme-koti-infuusioihin liittyvistä vaaroista, ja heille on annettu tarvittavaa koulutusta ensiapulääkkeiden käytöstä.
- Mikäli potilaalla ilmenee infuusioon liittyvä reaktio, **infuusio on keskeytettävä välittömästi**.
- Tarpeelliset toimenpiteet vakavan infuusioon liittyvän reaktion ilmetessä, **sisältäen hätätilanneyhteyshenkilön tiedot**, on kuvattu hoitopäiväkirjassa. Nämä tiedot on pidettävä saatavilla infuusion annon aikana.

Annos	
Tarvittava käyttövalmiin injektioliuoksen määrä (ml):	
Käytettyjen injektioipullojen määrä:	5 mg:n injektioipullot:
	35 mg:n injektioipullot:
Infuusion annon kesto:	
Antonopeus:	
Infuusioon liittyvät ongelmat/huomautukset (mukaan lukien infuusioon liittyvät reaktiot, suoritettut toimenpiteet ja tulos):	
Potilaan yleinen terveydentila – kuvaa kaikki uudet terveysongelmat, joita sinulla parhaillaan ilmenee ennen infuusiota, jos sellaisia on:	

5. Infuusiosta vastaavan henkilön nimi	
Infuusiopäivämäärä:	(PP-KK-VVVV):
Sairaanhoitaja:	
Hoitaja/huoltaja (jos eri kuin yllä):	

Tämä lomake on täytettävä jokaisesta infuusiotapahtumasta

- Potilaalle ja/tai huoltajalle/hoitajalle on ilmoitettu Fabrazyme-koti-infuusioihin liittyvistä vaaroista, ja heille on annettu tarvittavaa koulutusta ensiapulääkkeiden käytöstä.
- Mikäli potilaalla ilmenee infuusion liittyvä reaktio, **infuusio on keskeytettävä välittömästi**.
- Tarpeelliset toimenpiteet vakavan infuusion liittyvän reaktion ilmetessä, **sisältäen hätätilanneyhteyshenkilön tiedot**, on kuvattu hoitopäiväkirjassa. Nämä tiedot on pidettävä saatavilla infuusion annon aikana.

Annos	
Tarvittava käyttövalmiin injektioliuoksen määrä (ml):	
Käytettyjen injektioipullojen määrä:	5 mg:n injektioipullot:
	35 mg:n injektioipullot:
Infuusion annon kesto:	
Antonopeus:	
Infuusion liittyvät ongelmat/huomautukset (mukaan lukien infuusion liittyvät reaktiot, suoritettut toimenpiteet ja tulos):	
Potilaan yleinen terveydentila – kuvaa kaikki uudet terveysongelmat, joita sinulla parhaillaan ilmenee ennen infuusiota, jos sellaisia on:	

5. Infuusiosta vastaavan henkilön nimi	
Infuusiopäivämäärä:	(PP-KK-VVVV):
Sairaanhoitaja:	
Hoitaja/huoltaja (jos eri kuin yllä):	

Tämä lomake on täytettävä jokaisesta infuusiotapahtumasta

- Potilaalle ja/tai huoltajalle/hoitajalle on ilmoitettu Fabrazyme-koti-infuusioihin liittyvistä vaaroista, ja heille on annettu tarvittavaa koulutusta ensiapulääkkeiden käytöstä.
- Mikäli potilaalla ilmenee infuusioon liittyvä reaktio, **infuusio on keskeytettävä välittömästi**.
- Tarpeelliset toimenpiteet vakavan infuusion liittyvän reaktion ilmetessä, **sisältäen hätätilanneyhteyshenkilön tiedot**, on kuvattu hoitopäiväkirjassa. Nämä tiedot on pidettävä saatavilla infuusion annon aikana.

Annos	
Tarvittava käyttövalmiin injektioliuoksen määrä (ml):	
Käytettyjen injektioipullojen määrä:	5 mg:n injektioipullot:
	35 mg:n injektioipullot:
Infuusion annon kesto:	
Antonopeus:	
Infuusioon liittyvät ongelmat/huomautukset (mukaan lukien infuusioon liittyvät reaktiot, suoritettut toimenpiteet ja tulos):	
Potilaan yleinen terveydentila – kuvaa kaikki uudet terveysongelmat, joita sinulla parhaillaan ilmenee ennen infuusiota, jos sellaisia on:	

5. Infuusiosta vastaavan henkilön nimi	
Infuusiopäivämäärä:	(PP-KK-VVVV):
Sairaanhoitaja:	
Hoitaja/huoltaja (jos eri kuin yllä):	

Tämä lomake on täytettävä jokaisesta infuusiotapahtumasta

- Potilaalle ja/tai huoltajalle/hoitajalle on ilmoitettu Fabrazyme-koti-infuusioihin liittyvistä vaaroista, ja heille on annettu tarvittavaa koulutusta ensiapulääkkeiden käytöstä.
- Mikäli potilaalla ilmenee infuusioon liittyvä reaktio, **infuusio on keskeytettävä välittömästi**.
- Tarpeelliset toimenpiteet vakavan infuusion liittyvän reaktion ilmetessä, **sisältäen hätätilanneyhteyshenkilön tiedot**, on kuvattu hoitopäiväkirjassa. Nämä tiedot on pidettävä saatavilla infuusion annon aikana.

Annos	
Tarvittava käyttövalmiin injektioliuoksen määrä (ml):	
Käytettyjen injektioipullojen määrä:	5 mg:n injektioipullot:
	35 mg:n injektioipullot:
Infuusion annon kesto:	
Antonopeus:	
Infuusioon liittyvät ongelmat/huomautukset (mukaan lukien infuusioon liittyvät reaktiot, suoritettut toimenpiteet ja tulos):	
Potilaan yleinen terveydentila – kuvaa kaikki uudet terveysongelmat, joita sinulla parhaillaan ilmenee ennen infuusiota, jos sellaisia on:	

5. Infuusiosta vastaavan henkilön nimi	
Infuusiopäivämäärä:	(PP-KK-VVVV):
Sairaanhoitaja:	
Hoitaja/huoltaja (jos eri kuin yllä):	

Tämä lomake on täytettävä jokaisesta infuusiotapahtumasta

- Potilaalle ja/tai huoltajalle/hoitajalle on ilmoitettu Fabrazyme-koti-infuusioihin liittyvistä vaaroista, ja heille on annettu tarvittavaa koulutusta ensiapulääkkeiden käytöstä.
- Mikäli potilaalla ilmenee infuusion liittyvä reaktio, **infuusio on keskeytettävä välittömästi**.
- Tarpeelliset toimenpiteet vakavan infuusion liittyvän reaktion ilmetessä, **sisältäen hätätilanneyhteyshenkilön tiedot**, on kuvattu hoitopäiväkirjassa. Nämä tiedot on pidettävä saatavilla infuusion annon aikana.

Annos	
Tarvittava käyttövalmiin injektioliuoksen määrä (ml):	
Käytettyjen injektioipullojen määrä:	5 mg:n injektioipullot:
	35 mg:n injektioipullot:
Infuusion annon kesto:	
Antonopeus:	
Infuusion liittyvät ongelmat/huomautukset (mukaan lukien infuusion liittyvät reaktiot, suoritettut toimenpiteet ja tulos):	
Potilaan yleinen terveydentila – kuvaa kaikki uudet terveysongelmat, joita sinulla parhaillaan ilmenee ennen infuusiota, jos sellaisia on:	

5. Infuusiosta vastaavan henkilön nimi	
Infuusiopäivämäärä:	(PP-KK-VVVV):
Sairaanhoitaja:	
Hoitaja/huoltaja (jos eri kuin yllä):	

Tämä lomake on täytettävä jokaisesta infuusiotapahtumasta

- Potilaalle ja/tai huoltajalle/hoitajalle on ilmoitettu Fabrazyme-koti-infuusioihin liittyvistä vaaroista, ja heille on annettu tarvittavaa koulutusta ensiapulääkkeiden käytöstä.
- Mikäli potilaalla ilmenee infuusion liittyvä reaktio, **infuusio on keskeytettävä välittömästi**.
- Tarpeelliset toimenpiteet vakavan infuusion liittyvän reaktion ilmetessä, **sisältäen hätätilanneyhteyshenkilön tiedot**, on kuvattu hoitopäiväkirjassa. Nämä tiedot on pidettävä saatavilla infuusion annon aikana.

Annos	
Tarvittava käyttövalmiin injektioliuoksen määrä (ml):	
Käytettyjen injektioipullojen määrä:	5 mg:n injektioipullot:
	35 mg:n injektioipullot:
Infuusion annon kesto:	
Antonopeus:	
Infuusion liittyvät ongelmat/huomautukset (mukaan lukien infuusion liittyvät reaktiot, suoritettut toimenpiteet ja tulos):	
Potilaan yleinen terveydentila – kuvaa kaikki uudet terveysongelmat, joita sinulla parhaillaan ilmenee ennen infuusiota, jos sellaisia on:	

5. Infuusiosta vastaavan henkilön nimi	
Infuusiopäivämäärä:	(PP-KK-VVVV):
Sairaanhoitaja:	
Hoitaja/huoltaja (jos eri kuin yllä):	

Tämä lomake on täytettävä jokaisesta infuusiotapahtumasta

- Potilaalle ja/tai huoltajalle/hoitajalle on ilmoitettu Fabrazyme-koti-infuusioihin liittyvistä vaaroista, ja heille on annettu tarvittavaa koulutusta ensiapulääkkeiden käytöstä.
- Mikäli potilaalla ilmenee infuusion liittyvä reaktio, **infuusio on keskeytettävä välittömästi**.
- Tarpeelliset toimenpiteet vakavan infuusion liittyvän reaktion ilmetessä, **sisältäen hätätilanneyhteyshenkilön tiedot**, on kuvattu hoitopäiväkirjassa. Nämä tiedot on pidettävä saatavilla infuusion annon aikana.

Annos	
Tarvittava käyttövalmiin injektioliuoksen määrä (ml):	
Käytettyjen injektioipullojen määrä:	5 mg:n injektioipullot:
	35 mg:n injektioipullot:
Infuusion annon kesto:	
Antonopeus:	
Infuusion liittyvät ongelmat/huomautukset (mukaan lukien infuusion liittyvät reaktiot, suoritettut toimenpiteet ja tulos):	
Potilaan yleinen terveydentila – kuvaa kaikki uudet terveysongelmat, joita sinulla parhaillaan ilmenee ennen infuusiota, jos sellaisia on:	

5. Infuusiosta vastaavan henkilön nimi	
Infuusiopäivämäärä:	(PP-KK-VVVV):
Sairaanhoitaja:	
Hoitaja/huoltaja (jos eri kuin yllä):	

Muistiinpanoja

Muistiinpanoja

Sanofi Oy
puh: 0201 200 300, www.sanofi.fi