

TIETOA POTILAALLE

ORUDIS® 2,5 % geeli on lääkärisi sinulle määräämä reseptilääke. Hän on kertonut sinulle varotoimenpiteistä, jotka on otettava huomioon tätä lääkettä käytettäessä. Seuraava teksti on muistutus.

ORUDIS® 2,5 % geeli sisältää ketoprofeenia. Ketoprofeenia sisältävillä valmisteilla paikallisesti hoidettujen ihoalueiden altistuminen auringonvalolle (myös utuiselle auringonvalolle) tai solariumin UV-säteilylle voi aiheuttaa mahdollisesti vakavia ihoreaktioita valoherkistymisen takia, kuten harvinaista, vaikeata rakkulaista tai nystyräistä ihottumaa, joka voi levitä tai yleistyä. Myös muita ihon allergiareaktioita voi ilmetä, kuten punoitus, syyhyäminen ja polttelu.

Lisäksi yliherkkyysreaktioita on ilmennyt ketoprofeenin ja oktokryleenin yhteiskäytössä. Oktokryleeni on kemiallinen aurinkosuodatin, jota käytetään useissa kosmetiikka- ja hygieniatuotteissa, kuten auringonsuojatuotteissa, shampoissa, after shave -tuotteissa, suihku- ja kylpygeeleissä, ihovoiteissa, huulipunissa, ikääntymistä estävissä voiteissa, meikinpoistoaineissa ja hiussuihkeissa valon rappeuttavien vaikutusten viivyttämiseen.

Tästä syystä seuraavia ohjeita tulee noudattaa **ennen käyttöä, käytön aikana ja kaksi viikkoa** ketoprofeenigeelin käytön lopettamisen jälkeen.

- Älä käytä ketoprofeenigeeliä, jos sinulla on aiemmin todettu allergia ketoprofeenille (geelin vaikuttava ainesosa), tiaprofeenihapolle, fenofibraatille, UV-suoja-aineille (auringonsuoja-aineet, erityisesti oktokryleeniä sisältävät) tai hajusteille.
- Älä altista ketoprofeenigeelillä hoidettuja ihoalueita auringonvalolle (edes utuiselle auringonvalolle) tai solariumin UV-säteilylle, ja ollessasi ulkona suojaa nämä ihoalueet vaatetuksella hoidon aikana ja kahden viikon ajan hoidon lopettamisen jälkeen.
- Älä käytä ketoprofeenia sisältävää geeliä peittosidoksen alla.
- Pese kätesi perusteellisesti jokaisen ketoprofeenigeelin käyttökerran jälkeen.
- Rajoita ketoprofeenia sisältävän geelin käyttö enintään yhteen viikkoon.
- Lopeta geelin käyttö välittömästi, jos sinulla ilmenee iho-oireita, mukaan lukien oktokryleeniä sisältävien tuotteiden samanaikaisen käytön aiheuttamat oireet

Saat lisätietoja ottamalla yhteyttä lääkäriisi tai apteekkihenkilökuntaan.