

Käyttöaihe:

Clozapine Accord on reseptilääke, joka on tarkoitettu

- sellaisten skitsofreniapotilaiden hoitoon, joille muut lääkkeet eivät ole tehonneet.

Skitsofrenia on psykiatrinen sairaus, johon kuuluvat ajattelun, tunnereaktioiden ja käyttäytymisen häiriöt. Tätä lääkettä voi käyttää skitsofrenian hoitoon vain, jos olet jo kokeillut vähintään kahta muuta psykoosiläkettä, mukaan lukien jokin uudempi, ns. epätyypillinen psykoosilääke, ja nämä lääkkeet eivät ole tehonneet tai ne ovat aiheuttaneet vaikeita haittavaikutuksia, joita ei ole voitu hoitaa.

- Parkinsonin taudin yhteydessä esiintyvien vaikeiden ajatus-, tunne -ja käytöshäiriöiden hoitoon silloin, kun muu lääkitys ei ole tehonnut.

Tärkeää turvallisuutta koskevaa tietoa**TÄRKEÄ VAROITUS:****CLOZAPINE ACCORD -VALMISTEEN KÄYTTÖÖN ON YHDISTETTY MERKITTÄVÄ RISKI****SEURAAVIEN TILOJEN KEHITTYMISELLE:****AGRANULOSYTOOSI**

- Agranulosytoosi on verisairaus, jossa luuydin (luun sisällä oleva pehmytkudos, joka auttaa muodostamaan verisoluja) ei muodosta tarpeeksi tietyn tyyppisiä valkosoluja eli neutrofiilejä, jotka taistelevat infektiota vastaan. Agranulosytoosi voi johtaa vakavaan infekioon ja kuolemaan.
- Ota heti yhteys lääkäriin, jos sinulla esiintyy merkkejä vilustumisesta tai kuumeesta, sinulla on flunssan kaltaisia oireita, kurkkukipua tai muita infektion oireita, Clozapine Accord -hoidon aikana. Sinulta on pikaisesti otettava verinäyte, jotta voidaan tarkistaa, johtuvatko oireesi lääkkeestä.
- Ennen Clozapine Accord -hoidon aloittamista lääkäri kysyy aiemmista sairauksistasi ja ottaa verikokeen varmistukseksi, että veresi valkosolumäärä on normaali. Tämän selvittäminen on tärkeää, koska elimistösi tarvitsee valkosoluja puolustautuakseen infektioita vastaan.
- Clozapine Accord voi aiheuttaa vakavaa veren valkosolujen määrän vähenemistä (ns. agranulosytoosia). Vain säännöllisten verikokeiden avulla lääkäri voi selvittää, onko sinulla riski saada agranulosytoosi.
- Verikokeet on tehtävä kerran viikossa hoidon ensimmäisten 18 viikon aikana ja tämän jälkeen vähintään kerran kuukaudessa.
- Jos veren valkosolujen määrä on laskenut, Clozapine Accord -hoito on lopetettava välittömästi, minkä jälkeen valkosolujen määrän tulisi palautua normaaliksi.
- Sinun on käytävä verikokeissa 4 viikon ajan Clozapine Accord -hoidon lopettamisesta.

SYDÄNLIHASTULEHDUS JA KARDIOMYOPATIA:

- Clozapine Accord -tablettien tiedetään aiheuttavan sydänlihasten tulehdusta (ns. myokardiitti) ja sydänlihasten laajenemista (ns. kardiomyopatia), jotka voivat johtaa kuolemaan. Ota heti yhteys lääkäriin, jos sydämesi syke on nopea tai epäsäännöllinen, jopa levossa, tai sinulla on sydämentykytyksiä, hengitysvaikeuksia, rintakipua tai selittämätöntä väsymystä. Lääkärin täytyy tutkia sydämesi ja tarvittaessa ohjata sinut välittömästi sydäntautilääkärille.