

MITÄ PITÄÄ TEHDÄ ENNEN AGOMELATIINIHOIDON ALOITTAMISTA?

- Kerro lääkärille, jos tiedät, ettei maksasi toimi kunnolla. Älä silloin ota agomelatiinia.
- On myös muita syitä, miksi agomelatiini ei välttämättä sovi sinulle.

Kysy lääkäriltä neuvoa seuraavista:

- jos sinulla on joskus ollut maksan toimintahäiriötä
- jos olet ylipainoinen
- jos sairastat diabetesta
- jos käytät alkoholia
- jos käytät muita lääkkeitä (joidenkin lääkkeiden tiedetään vaikuttavan maksaan).

MITEN VOIT VÄLTÄÄ MAKSAN TOIMINTAHÄIRIÖT HOIDON AIKANA?

► Käy säännöllisesti verikokeissa

• Miksi?

Lääkäri on todennäköisesti tutkinut **ennen hoidon aloittamista**, että maksasi toimii kunnolla. Lääkäri selvittää määräämiensä verikokeiden avulla, **miten maksasi toimii** ja sopiiko agomelatiinihoito sinulle.

Veren maksaentsyymipitoisuudet saattavat suurentua agomelatiinihoidon aikana. Maksaentsyymipitoisuudet kertovat, toimiiko maksasi kunnolla, ja niiden seuraaminen on välttämätöntä hoidon aikana.

• Milloin?

Verikokeet

	Ennen hoidon aloittamista tai annosta suurennettaessa	Noin 3 viikon kuluttua	Noin 6 viikon kuluttua	Noin 3 kuukauden kuluttua	Noin 6 kuukauden kuluttua
Verikokeet	✓	✓	✓	✓	✓

Jos lääkäri suurentaa annostuksesi 50 mg:aan, kokeet pitää tehdä uudelleen.

Muista ottaa potilasoppaan **MUISTUTUSSIVU VERIKOKEISTA** (ks. seuraava sivu) mukaasi lääkärin vastaanotolle.

Kerro lääkärille heti, jos saat tietää veresi maksaentsyymipitoisuuksien suurentuneen hoidon aikana.

► Tarkkaile maksan toimintahäiriöiden oireita

Jos havaitset jotakin seuraavista, maksasi ei ehkä toimi kunnolla:

- ihon tai silmien keltaisuutta
- tummaa virtsaa
- vaaleita ulosteita
- ylävatsan oikean puolen kipua
- epätavallista väsymystä (etenkin edellä mainittujen oireiden yhteydessä)

⇒ Hakeudu kiireellisesti lääkäriin. Lääkäri saattaa kehottaa sinua lopettamaan agomelatiinihoidon.

Muistutussivu verikokeista

► Muista

Agomelatiinihoidon aikana on tärkeää käydä verikokeissa säännöllisesti.

Verikokeiden ottamisajankohdat on helpompi muistaa, kun merkitset ne seuraavaan taulukkoon.

Agomelatiini 25 mg	Päivämäärä
Lääkityksen aloituspäivämäärä:	
Verikokeet maksaentsyymipitoisuuksien määrittämiseksi	
Ensimmäisen verikokeen päivämäärä <i>(ennen hoidon aloittamista)</i>	
Toisen verikokeen päivämäärä <i>(noin 3 viikon kuluttua)</i>	
Kolmannen verikokeen päivämäärä <i>(noin 6 viikon kuluttua)</i>	
Neljännän verikokeen päivämäärä <i>(noin 3 kuukauden kuluttua)</i>	
Viidennen verikokeen päivämäärä <i>(noin 6 kuukauden kuluttua)</i>	

Lääkäri saattaa katsoa tarpeelliseksi ottaa verikokeita vielä edellä mainittujen lisäksi.

Mahdollinen annoksen suurentaminen 50 mg:aan	Päivämäärä
Lääkityksen nostopäivämäärä:	
Verikokeet maksaentsyymipitoisuuksien määrittämiseksi	
Verikoe agomelatiinin 50 mg:n annoksen käyttöä aloitettaessa	
Toisen verikokeen päivämäärä <i>(noin 3 viikon kuluttua)</i>	
Kolmannen verikokeen päivämäärä <i>(noin 6 viikon kuluttua)</i>	
Neljännän verikokeen päivämäärä <i>(noin 3 kuukauden kuluttua)</i>	
Viidennen verikokeen päivämäärä <i>(noin 6 kuukauden kuluttua)</i>	

Lääkäri saattaa katsoa tarpeelliseksi ottaa verikokeita vielä edellä mainittujen lisäksi.

Muista ottaa tämä opas mukaasi lääkärin vastaanotolle.

Ks. lisätietoja pakkausselosteesta.

Jos epäilet saaneesi lääkkeestä haittavaikutuksen, kerro siitä hoitavalle lääkärille. Kerro lääkärille myös kaikista samanaikaisesti käyttämistäsi lääkkeistä ja ravintolisistä, sillä niillä voi olla yhteisvaikutuksia.

Haittavaikutusilmoituksen voi tehdä myös itse:

Servier Finland Oy:n sivusto:
www.servierfinland.fi

tai

www-sivusto: www.fimea.fi
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea
Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri
PL 55
00034 FIMEA

Potilaan opas

AGOMELATIINI

Les Laboratoires Servier ja Anpharm Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne S.A.

Suositukses maksan haittavaikutusten välttämiseksi

Agomelatiini voi aiheuttaa haittavaikutuksena mm. muutoksia maksan toimintaan.

Tässä oppaassa kerrotaan suosituksista maksan haittavaikutusten välttämiseksi ja annetaan ohjeet, miten pitää toimia, jos agomelatiinihoidon aikana ilmaantuu tällaisia haittavaikutuksia.

Lisätietoja saat sinua hoitavalta lääkäriltä.

Agomelatiini on masennuslääke, jota käytetään masennuksen hoitoon. Jotta saat lääkehoidostasi parhaan mahdollisen hyödyn, noudata lääkärin antamia ohjeita agomelatiinihoidosta (annostus, hoidon kesto, hoitoon liitetyvä seuranta, kuten seurantakäynnit lääkärin vastaanotolla, verikokeet).