




## Adrenaliini-injektorisi anafylaktisen reaktion hoidossa

# Adrenaliini-injektori äkillisen anafylaktisen reaktion hoitoon

Emerade adrenaliini-injektori on tarkoitettu anafylaksian (hengenvaarallinen allerginen reaktio) akuuttihoitoon. Anafylaktisen reaktion voi saada hyönteisen pistosta, ravintoaineista tai lääkkeitä. Anafylaksian saattaa laukaista myös rasitus tai jokin tuntematon syy. Emerade on reseptilääke.



1. Poista suojus
2. Aseta Emerade reiden ulkosyrjää vasten 90° kulmassa ja paina se niin tiukasti, että neulansuojus työntyy injektorin sisään. Kuulet napsahduksen, kun Emerade on aktivoitu ja injektio on annettu reiteen.  
**ja**  
Pidä Emerade-kynää tukevasti reittä vasten 5 sekunnin ajan.  
Hiero pistoskohtaa kevyesti jälkeinpäin.
3. Soita 112, tilaa ambulanssi ja sano "anafylaksia", vaikka tuntisit olosi paranevan.

Odota ambulanssia makuuasennossa ja pidä jalat ylhäällä. Jos sinun on vaikeata hengittää, voit nousta istumaan. Jos mahdollista, hae apua välittömästi Emeraden käytön jälkeen. Pyydä, että joku pysyttelee luonasi kunnes ambulanssi saapuu.



Katso ohjevideo ja lue lisää anafylaksiasta osoitteessa: [emerade.com/fi](https://emerade.com/fi)

## Milloin käytät Emeradea

Äkillisen allergisen reaktion oireet saattavat tulla muutamassa minuutissa sen jälkeen kun olet ollut kosketuksissa allergiaa aiheuttavaan aineeseen.

Oireet:

- Kutina erityisesti jalkapohjissa, käsissä tai päässä
- Pistely suussa
- Turvotus suussa ja nielussa, huulissa ja silmissä
- Kutina, punoitus tai nokkosrokko missä tahansa keholla
- Huimaus, ahdistus, kylmä hiki
- Vatsakivut, pahoinvointi ja oksennus
- Hengenahdistus tai astmaoireet
- Äkillinen heikkous, verenpaineen lasku, pyörtyminen
- Sekavuus tai tajunnan menetys

**Kriittiset oireet:** Hengitysvaikeus, suu ja nielu turpoavat, tunnet äkkiä väsymystä ja huimausta tai tunnet jatkuvasti tilasi huonontuvan. Jos sinulla ilmenee näitä oireita, käytä Emeradea välittömästi. Soita hätänumeroon 112.

Adrenaliini estää verenpaineen laskua, virkistää sydämen toimintaa ja parantaa hengitystä. Pidä aina Emerade mukanas, mikäli sinulla on vaara joutua kosketuksiin aineiden kanssa, joille olet allerginen.

## Älä epäröi käyttää Emeradea

Pistä Emerade heti vaikea-asteisen allergisen reaktion oireiden ilmaantuessa. Noudata lääkärisi ohjeita ja tutustu etukäteen pakkauksen sisällä oleviin ohjeisiin.

On tärkeää, että pidät Emerade-adrenaliini-injektoria aina mukanas, jos sinulla on äkillisen allergisen reaktion riski.

On tärkeää lukea Emerade-pakkaukselle ja sieltä erityisesti varoitukset ja nou-

dattaa varovaisuutta. On suositeltavaa, että myös lähipiirille ohjeistetaan Emeraden oikeaa käyttöä.

Emerade on tarkoitettu ensiavuksi. Sinun pitää aina hakeutua hoitoon Emeraden käyttämisen jälkeen.

## Kuinka tarkistetaan, onko injektorisi aktivoitunut?

Käytettyäsi Emeraden varmista, että adrenaliini-injektorisi on aktivoitunut.

Ellei neulasuojus ole työntynyt ulos, Emeradea ei ole aktivoitu.



Käyttämättömän Emeraden (ennen aktivoitua) neulasuojus on normaaliasennossa.



Aktivoituneen Emeraden neulasuojus on työntynyt ulos.

Etiketissä oleva nuoli osoittaa kohdan, josta etikettiä voidaan nostaa pois tarkistusikkunan päältä.

Jos tarkistusikkunassa näkyy kirkas neste, annosta ei ole käytetty. Jos Emerade on aktivoitu ja adrenaliiniannos käytetty, tarkistusikkunassa näkyy värillinen mäntä.



Keltainen mäntä:  
Emerade 150  
mikrogrammaa

Vihreä mäntä:  
Emerade 300  
mikrogrammaa

Sininen mäntä:  
Emerade 500  
mikrogrammaa

Jos Emerade-kynä ei aktivoitu, paina kynä injektiokohtaa vasten voimakkaammin uudelleen. Jos injektion anto ei onnistu, käytä välittömästi toista kynää.

## Uusi annos 5–15 minuutin kuluttua

Joskus yksi annos adrenaliinia ei riitä poistamaan akuuttia allergista reaktiota kokonaan. Lääkärisi voi sen vuoksi suositella annoksen uusimista 5–15 minuutin jälkeen ottamalla uusi Emerade. Sen vuoksi suositellaan, että mukanasasi on aina enemmän kuin yksi Emerade.

## Suositteltu annos

Emerade on saatavana kolmena eri annoksena: 150, 300 ja 500 mikrogrammaa. Lääkärisi ratkaisee, mikä annos sopii sinulle.

Yksi Emerade sisältää yhden annoksen eikä samaa adrenaliini-injektoria voida käyttää uudelleen.

## Säilytys

Emerade sietää kylmää, mutta älä anna sen jäätyä (0°C). Säilytetään korkeintaan 25°C lämpötilassa.

Jos sinulla on harjoitusinjektori, säilytä se erillään Emeradesta.

Säilytä Emerade mukana toimitetussa muovisessa suojakotelossa. Muovikoteloa, jossa kynä on/kynät ovat, voidaan säilyttää ulkopakkauksessa.

## Tutki adrenaliini

Tarkista liuos säännöllisesti nostamalla adrenaliini-injektoria näyttöikkunan päällä olevaa etikettiä varmistaaksesi, että liuos on kirkas ja väritön. Jos liuos on värjäytynyt tai sakkainen, korvaa injektori uudella Emerade-annoksella ja vie vanha injektori apteekkiin hävitettäväksi.

## Helppokäyttöinen

Emeradessa on suuri neulan ulostuloreikä adrenaliini-injektoria kärjessä ja toinen pää on umpinainen. Tiedät vaistomaisesti kumpi pää tulee painaa reittä vasten.

## Käytön jälkeen

Neula suojautuu automaattisesti käytön jälkeen injektoria sisään.

## Lentomatalla

Voit sijoittaa Emeraden käsimatkatavaroihin. Voit varmuuden vuoksi pyytää lääkärinä kirjoittamaan matkustusta varten todistuksen Emeraden tarpeellisuudesta. Lomake löytyy osoitteesta: [emerade.com/fi](http://emerade.com/fi).



Voit tilata kotelon adrenaliini-injektoria varten osoitteesta: [emerade.com/fi](http://emerade.com/fi)

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille, apteekkihenkilökunnalle tai sairaanhoitajalle. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan Fimeaan osoitteessa [www.fimea.fi](http://www.fimea.fi) tai Medeca Pharma AB:lle.

## Medeca Pharma AB

Box 24005, 75024 Uppsala, Sverige  
[www.emerade.com/fi](http://www.emerade.com/fi)

Tel +46 18-25 85 30  
[www.medeca.se](http://www.medeca.se)

Fax +46 18-24 71 53  
[info@medeca.se](mailto:info@medeca.se)