

POTILASKORTTI

PADCEV

(enfortumabivedotiini)

- Pidä tätä korttia **aina** mukana, erityisesti kun matkustat tai jos menet toisen lääkärin vastaanotolle.
- Muista aina näyttää tämä kortti lääkärille, apteekkihenkilökunnalle tai sairaanhoitajalle, kun sinulle määrätään mikä tahansa lääkehoito tai sinulla on sairaalakäynti tai muu lääkärin vastaanotto.
- Ota **välittömästi** yhteyttä lääkäriin, jos sinulle ilmaantuu haittavaikutuksia, erityisesti tässä kortissa lueteltuja haittavaikutuksia.

TÄRKEÄÄ TURVALLISUUSTIETOA POTILAILLE

Padcev voi aiheuttaa vakavia haittavaikutuksia, mukaan lukien vakavia ihoreaktioita (Stevens-Johnsonin oireyhtymä, toksinen epidermaalinen nekrolyysi ja muut vakavat ihottumat, kuten symmetrinen lääkkeeseen liittyvä ihopoimu- ja taiveihottuma).

Kerro lääkärille, apteekkihenkilökunnalle tai sairaanhoitajalle **viipymättä**, jos saat minkä tahansa seuraavista haittavaikutuksista:

- ihottuma tai kutina, joka pahenee jatkuvasti tai uusiutuu hoidon jälkeen,
- ihorakkulat tai ihon kuoriutuminen,
- kivuliaat ihovauriot tai haavaumat suussa tai nenässä, nielussa tai sukupuolielinten alueella,
- kuume tai flunssan kaltaiset oireet,
- imusolmukkeiden turvotus.

Oireet voivat olla merkkejä vakavasta ihoreaktiosta, joka voi ilmaantua tämän lääkevalmisteen käytön aikana, erityisesti ensimmäisten hoitoviikkojen aikana. Jos näin tapahtuu, lääkäri tarkkailee vointiasi ja voi määrätä sinulle lääkettä iho-oireidesi hoitoon. Lääkäri voi keskeyttää tai lopettaa lääkehoidon, jos ihoreaktiosi pahenee. Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin puoleen.

TÄRKEÄÄ TIETOA TERVEYDENHUOLLON AMMATTILAISILLE

- Tätä potilasta hoidetaan Padcev-lääkevalmisteen (enfortumabivedotiini), joka voi aiheuttaa vakavia ihoreaktioita, mukaan lukien Stevens-Johnsonin oireyhtymää ja toksista epidermaalista nekrolyysiä (pääasiassa ensimmäisen hoitotapauksen aikana).
- Oireita ovat ihottuma tai kutina, joka pahenee tai uusiutuu hoidon jälkeen, ihorakkuloiden muodostuminen tai ihon kuoriutuminen, kivuliaat ihovauriot tai haavaumat suussa tai nenässä, nielussa tai sukupuolielinten alueella, kuume tai flunssan kaltaiset oireet tai imusolmukkeiden turvotus.
- Kuume tai flunssan kaltaiset oireet voivat olla ensimmäinen merkki ihoreaktiosta. Potilaita on seurattava ihoreaktioiden varalta ensimmäisestä hoitotapauksesta alkaen ja koko hoidon ajan. Paikallisia kortikosteroideja/antihistamiineja voidaan harkita lievien tai keskivaikeiden ihoreaktioiden hoitoon.
- Jos Stevens-Johnsonin oireyhtymää tai toksista epidermaalista nekrolyysiä epäillään tai jos rakkulaisia ihovaurioita ilmenee, hoito on keskeytettävä **välittömästi** ja potilas ohjattava erikoissairaanhoidon. Histologinen varmistus on ratkaisevan tärkeää varhaisessa tunnistamisessa, sillä diagnoosi ja toimenpiteet voivat parantaa ennustetta.
- Jos ilmenee Stevens-Johnsonin oireyhtymää tai toksista epidermaalista nekrolyysiä, asteen 4 tai toistuvia asteen 3 ihoreaktioita, hoito on lopetettava pysyvästi.
- Keskeytä hoito kuumeisen asteen 2, huononevan asteen 2 tai asteen 3 ihoreaktioiden ilmaantuessa, kunnes aste on ≤ 1 , jolloin hoitoa voi jatkaa samalla annostasolla tai harkita

annoksen pienentämistä yhdellä annostasolla. Harkitse potilaan ohjaamista erikoissairaanhoidon.

Pyydä lisätietoja potilaan hematologilta tai syöpälääkäriltä ja tutustu enfortumabivedotiinin valmisteyhteenvetoon, joka on saatavilla osoitteessa <https://www.ema.europa.eu/>.

Nimeni: _____

Puhelinnumeroni: _____

Yhteyshenkilö hätätilanteessa: _____

Yhteyshenkilön puhelinnumero hätätilanteessa:

Hematologi/Onkologi/Onkologian sairaanhoitaja: _____

Puhelinnumero: _____

Puhelinnumero aukioloaikojen jälkeen: _____

Sairaala, jossa minua hoidetaan:

Sairaalan yhteyshenkilö: _____

PADCEV-hoidon aloituspäivä: _____