


## Hur du använder Xyrem®

Din Xyrem® låda innehåller en flaska Xyrem® oral lösning, en flaskadapter, en mätspruta, två doseringskoppar med barnsäkra lock att använda vid förberedelse och lagring av dina två kväldsdozer samt Xyrem® patientinformation.

Det är viktigt att du enbart använder sprutan som medföljer i förpackningen när du förbereder doser av Xyrem.




Figur 1.

Vänligen läs patientinformationen för ytterligare viktig information innan du tar dina första doser av Xyrem®. Ta alltid Xyrem® exakt enligt din läkares anvisningar.

Om du har några ytterligare frågor eller funderingar om Xyrem®, kontakta din läkare.


Du behöver förbereda båda doserna innan du går och lägger dig.

1. Avlägsna flasklocket genom att trycka ner samtidigt som du vrider locket moturs (åt vänster). Efter att du tagit bort locket, ställ flaskan upprätt på ett bord. Det finns en plasttäckt försegling på flaskans topp, vilken måste avlägsnas innan flaskan används första gången. Medan du håller flaskan i upprätt position, sätt i flaskadaptern i flaskans hals. Detta behöver bara göras första gången flaskan öppnas. Adaptorn kan därefter lämnas kvar i flaskan vid all efterföljande användning (se figur 2).




Figur 2.

2. Sätt därefter i spetsen av mätsprutan mitt i flaskans öppning och tryck ner hårt (se figur 3).



Figur 3.

- 3.** Håll flaskan och sprutan med ena handen och dra upp den förskrivna dosen med den andra handen genom att dra upp kolven. NOTERA: Läkemedlet kommer inte att flyta in i sprutan om du inte håller flaskan upprätt (se figur 4).




Figur 4.

- 4.** Avlägsna sprutan från flaskans mittöppning. Töm läkemedlet från sprutan i en av de medföljande doseringskopparna genom att trycka ner kolven. Upprepa detta steg för den andra doseringskoppen. Tillsätt därefter ca 60 ml vatten till varje doseringskopp – 60 ml är ca 4 matskedar (se figur 5).



Figur 5.

- 5.** Placera de medföljande locken på doseringskopparna och vrid varje lock medurs (mot höger) tills det klickar och låser sig i sin barnsäkra position (se figur 6). Skölj ur sprutan med vatten.



Figur 6.

- 6.** Placera din andra dos i närheten av din säng strax innan du går och lägger dig. Du kanske måste sätta ett alarm så att du vaknar och kan ta din andra dos tidigast 2.5 timmar och senast 4 timmar efter din första dos. Avlägsna locket från den första doseringskoppen (se figur 7) genom att trycka ner



det barnsäkra locket och vrida det moturs (mot vänster). Drink hela den första dosen sittande i sängen, sätt på locket och lägg dig sedan genast ner.

Figur 7.

- 7.** När du vaknar 2.5 till 4 timmar senare, avlägsna locket från den andra doseringskoppen. Sätt dig upp i sängen och drink hela den andra dosen precis innan du lägger dig ner för att fortsätta sova. Sätt på locket på den andra koppen.

UCB, Xyrem, Hur du använder Xyrem, v3.0  
© Copyright UCB Biopharma SRL 2020, med ensamrätt  
Denna information är en del av det riskhanteringsprogram som begärts av EMA



UCB Pharma Oy Finland  
Bertel Jungs plats 5, 02600 Esbo  
Tel. (09) 2514 4221  
ucb.finland@ucb.com