HA ALLTID DET HÄR KORTET MED DIG VISA DET FÖR ALL HÄLSO- OCH SJUKVÅRDS-PERSONAL SOM VÅRDAR DIG OCH OM DU BEHÖVER SJUKHUSVÅRD

Meddelande om sekretess och datasäkerhet
All information som du lämnar kommer att behandlas i enlighet med Sobis dataskyddspolicy och i enlighet med de syften för vilka den lämnas. Du hittar fullständig information om hur personuppgifter skyddas hos Sobi i vår policy som finns här: https://sobi.fi/tietosuojakäytäntö (på finska). Om du inte samtycker till denna användning av dina uppgifter, ber vi dig att kontakta oss med hjälp av kontaktuppgifterna på webbsidan.

INFORMATION TILL BEHANDLANDE LÄKARE

Denna patient har ordinerats ASPAVELI® (pegcetakoplan), som kan öka patientens risk för allvarliga infektioner orsakade av bakterier som *Streptococcus pneumoniae, Neisseria meningitidis och Haemophilus influenzae* typ B.

- Allvarliga bakteriella infektioner kan snabbt bli livshotande om de inte upptäcks och behandlas i tid.
- Kontrollera patienten noga för tidiga tecken och symtom på allvarlig infektion och utvärdera omedelbart vid misstanke om en infektion. Behandla konstaterade infektioner utan dröjsmål.
- Kontakta patientens förskrivande läkare snarast möjligt vid misstanke om en allvarlig infektion.

Mer information om ASPAVELI® finns i den fullständiga produktresumén på: www.fimea.fi

Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning via www.fimea.fi.

Patienter som får ASPAVELI® ska alltid ha med sig detta kort. Patienten måste visa referensnumret för det kontrollerade distributionssystemet för apotekspersonalen innan ASPAVELI® får lämnas ut.

NP-49794 | 4/2026. Godkänd av FIMEA 4/2026

ASPAVELI® kan öka risken för allvarliga och livshotande infektioner. Allvarliga infektioner kan snabbt bli livshotande om de inte upptäcks och behandlas i tid. Kontakta omedelbart läkare eller sök akutvård om du får något av följande tecken och symtom på en allvarlig infektion:

- huvudvärk och feber
- feber och utslag
- feber med eller utan skakningar och frossa
- andfåddhet
- hög hjärtfrekvens
- kallsvettig hud

- huvudvärk med stel nacke eller stel rygg
- huvudvärk med illamående eller kräkningar
- ljuskänsliga ögon
- muskelvärk med influensaliknande symtom
- förvirring
- extrem smärta eller extremt obehag

Ha alltid detta kort med dig under behandlingen och i 2 månader efter den sista dosen. Risken för allvarliga infektioner kan kvarstå i flera veckor efter den sista dosen.

Visa detta kort för all hälso- och sjukvårdspersonal som vårdar dig

_____

Patientens namn

_____

Referensnummer för det kontrollerade distributionssystemet

_____

Förskrivarens namn

_____

Förskrivarens telefonnummer