

PATIENTKORT

<p>((Baksida))</p> <p>GRAVIDITET, FERTILITET, AMNING</p> <p>Ta inte Ferriprox om du är gravid, försöker bli gravid eller ammar. Ferriprox kan orsaka allvarliga skador på barnet. Om du är gravid eller ammar under behandlingen med Ferriprox ska du meddela din läkare och omedelbart fråga om råd.</p> <p>Fertila kvinnor rekommenderas att använd en effektiv preventivmetod under behandlingen med Ferriprox och under 6 månader efter den sista dosen. Män rekommenderas att använda en effektiv preventivmetod under behandlingen med Ferriprox och under 3 månader efter den sista dosen. Fråga din läkare vilken metod som passar bäst för dig.</p> <p style="text-align: right;">4</p>	<p>((Framsida))</p> <p>PATIENTKORT</p> <p>Viktiga säkerhetspåminnelser för patienter som tar Ferriprox (deferipron)</p> <p>Ordinerande läkare: _____</p> <p>Tfn: _____</p> <p style="text-align: right;">1</p>
<p>((Insida 1))</p> <p>DINA VITA BLODKROPPAR BEHÖVER KONTROLLERAS VID BEHANDLING MED FERRIPROX</p> <p>Det finns en liten risk att du utvecklar agranulocytos (mycket lågt antal vita blodkroppar) när du tar Ferriprox, vilket kan leda till allvarliga infektioner. Även om agranulocytos endast påverkar 1 till 2 av 100 användare är det viktigt att göra regelbundna blodtester.</p> <p style="text-align: right;">2</p>	<p>((Insida 2))</p> <p>Du ska göra följande:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Se till att kontrollera dina blodvärden varje vecka under det första behandlingsåret med Ferriprox och så ofta som din läkare rekommenderar därefter.2. Om du får några symtom på infektion som feber, halsont eller influensaliknande symptom, kontakta omedelbart läkare. Ditt antal vita blodkroppar måste kontrolleras inom 24 timmar för att detektera potentiell agranulocytos. <p style="text-align: right;">3</p>