

Potilaan muistutuskortti

Tämä muistutuskortti sisältää tärkeää turvallisuutta koskevaa tietoa, josta sinun tulee olla tietoinen ennen syöpään liittyviin sairauksiin annettavaa Pamifos 3 mg/ml - infuusiota sekä myös hoidon aikana.

Lääkärisi on suositellut sinulle Pamifos 3 mg/ml - infuusiota ehkäisemään luustokomplikaatioita (esim. murtumat), jotka voivat aiheutua luustometastaaseista tai luuhun vaikuttavasta kasvaimesta tai vähentämään kasvainten aiheuttamaa veren kohonnutta kalsiumpitoisuutta.

Leukaluun osteonekroosiksi (luukuolioksi) kutsuttua haittavaikutusta on raportoitu tuntemattomalla esiintyvyydellä potilailla, jotka saavat Pamifos 3 mg/ml - infuusiota syöpään liittyvien sairauksien hoitoon. Leukaluun osteonekroosia voi esiintyä myös hoidon päättymisen jälkeen.

Leukaluun osteonekroosin riskin pienentämiseksi on olemassa varotoimenpiteitä, joita sinun tulisi noudattaa:

Ennen hoidon aloittamista:

- Pyydä lääkäriä kertomaan sinulle leukaluun osteonekroosista ennen hoidon aloittamista.
- Tarkasta lääkäritäsi, onko hammastarkastus suositeltavaa tehdä ennen Pamifos 3 mg/ml -hoidon aloittamista.
- Kerro lääkärille/sairaanhoitajalle (terveydenhoidon ammattilaiselle), jos sinulla on suun tai hampaiden terveyteen liittyviä ongelmia.

Potilailla, joille tehdään hammaskirurgista toimenpidettä (esim. hampaanpoisto), jotka eivät käy säännöllisessä hammashoidossa tai joilla on iensairaus, jotka tupakoivat, jotka saavat erityyppisiä syöpähoitoja tai joita on aiemmin hoidettu bisfosfonaatilla (käytetään luusairauksien hoitoon tai ennaltaehkäisyyn), voi olla suurentunut leukaluun osteonekroosin riski.

Hoidon aikana:

- Sinun tulee huolehtia hyvästä suuhygieniasta, varmistua proteesisi istuvuudesta ja käydä säännöllisesti hammastarkastuksessa.
- Jos sinulle tehdään parhaillaan hampaiden hoitotoimenpidettä tai olet menossa hammaskirurgiseen toimenpiteeseen (esim. hampaan poisto), kerro asiasta lääkärillesi. Kerro myös hammaslääkärillesi, että sinua hoidetaan Pamifos 3 mg/ml -valmisteella.
- Ota välittömästi yhteyttä lääkäriisi ja hammaslääkäriisi, jos suussasi tai hampaissasi ilmenee ongelmia, esim. hampaan löystymistä, kipua tai turvotusta, parantumattomia haavaumia tai märkävuotoa, sillä ne saattavat olla merkkejä leukaluun osteonekroosista.

Lue lisätietoja lääkkeen mukana toimitettavasta pakkausselosteesta.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille, apteekkihenkilökunnalle tai sairaanhoitajalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www-sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 Fimea

VERSIO 2

KANSALLINEN HYVÄKSYMISPÄIVÄMÄÄRÄ: 11/2022