

Toctino (alitretinoiini)

Potilaan
muistutuskortti

Potilaan muistutuskortti

Lääkärin nimi:

Puhelinnumero:

TOCTINO-valmistetta ei saa käyttää raskauden aikana.

TOCTINO voi aiheuttaa vakavaa haittaa sikiölle, jos odottava äiti käyttää sitä.

Jos tulet raskaaksi tai epäilet olevasi raskaana, lopeta TOCTINO-valmisteen käyttö välittömästi ja ota yhteyttä lääkäriin.

Lue pakkausseloste huolellisesti ennen hoidon aloittamista.

Jos sinulla on kysyttävää tai huolenaiheita TOCTINO-valmisteen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

Toimi näin, jos olet nainen, joka voi tulla raskaaksi:

- Sinun on käytettävä vähintään yhtä erittäin tehokasta ehkäisymenetelmää (kuten ehkäisykierukkaa tai -implantaattia) tai kahta tehokasta eri tavoin toimivaa ehkäisymenetelmää (kuten ehkäisytabletteja ja lisänä kondomia) oikealla tavalla ennen hoitoa, hoidon aikana ja kuukauden ajan hoidon päätyttyä.
- Et saa tulla raskaaksi TOCTINO-valmisteen käytön aikana etkä kuukauteen hoidon päätyttyä.
- Sinun on käytävä säännöllisesti seurantakäynneillä ja raskaustesteissä:
 - Sinun on käytävä raskaustestissä ennen hoidon aloittamista, ja raskaustestin tuloksen on oltava negatiivinen.
 - Sinun on käytävä raskaustesteissä hoidon aikana (mieluiten kuukausittain), jotta hoidon aikainen raskaus voidaan sulkea pois. Sinun on käytävä vielä viimeisessä raskaustestissä kuukauden kuluttua hoidon päättymisestä.

Muistutus miehille ja naisille

Tämä lääke on määrätty vain sinulle. Sitä ei saa antaa muiden käyttöön. Palauta käyttämättömät kapselit takaisin apteekkiin.

Terveystieteiden ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan epäilyistä lääkkeen haittavaikutuksista Fimealle osoitteella:

www-sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 FIMEA

Fimean hyväksymispäivämäärä: 17.6.2026

Porkkalankatu 20 A, 00180 Helsinki

Puh. 010 30 30 30, www.gsk.fi