Litfulo
(ritlesitinibi)
POTILASKORTTI

▼ Tähän lääkevalmisteeseen kohdistuu lisäseuranta. Tällä tavalla voidaan havaita nopeasti turvallisuutta koskevaa uutta tietoa.

Versio: 2.0 | Hyväksytty: 16.10.2026

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskukseen Fimeaan

www-sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

FI-00034 FIMEA

tai

Pfizer Oy:n puhelinvaihteen (09-430 040) tai portaalin (www.pfizersafetyreporting.com) kautta.

Nimesi: _____

Litfulo-valmistetta määränneen lääkärin nimi:

_____

Lääkärin yhteystiedot: _____

Litfulo-hoidon aloituspäivä: _____

Litfulo-hoitoa koskevaa turvallisuustietoa potilaalle

- Tässä kortissa on tärkeitä turvallisuustietoja, joista sinun pitää olla tietoinen ennen Litfulo-hoitoa ja sen aikana.
- Lisätietoja on pakkausselosteessa, joka sisältyy jokaiseen Litfulo-pakkaukseen.
- Kysy lääkäriltä tai apteekkihenkilökunnalta, jos jokin asia on epäselvä.

Pidä tämä kortti aina mukanasi ja näytä se kaikille hoitoosi osallistuville terveydenhuollon ammattilaisille – esimerkiksi apteekkihenkilökunnalle tai päivystyspoliklinikan lääkärille.

Mitä Litfulo on ja mihin sitä käytetään:

Litfulo sisältää vaikuttavana aineena ritlesitinibiä. Sitä käytetään vaikean pälvikaljun hoitoon aikuisille ja vähintään 12-vuotiaille nuorille. Pälvikalju on sairaus, jossa immuunijärjestelmä hyökkää elimistön omia soluja vastaan ja aiheuttaa karvatupen tulehduksen,

joka johtaa hiusten tai karvojen irtoamiseen päänahan, kasvojen ja/tai muiden ruumiinosien alueelta.

Litfulo vaikuttaa vähentämällä karvatupen tulehdusprosessiin osallistuvien entsyymien, Janus-kinaasi 3:n ja TEC-kinaasien, toimintaa. Tämä vähentää tulehdusta ja edistää siten hiusten takaisinkasvua pälvikaljua sairastavilla potilailla.

Sinun on oltava tietoinen tietyistä haitta-vaikutuksista ja jäljempänä luetelluista tärkeistä asioista. Kerro lääkärille, jos sinulle ilmaantuu jokin haittavaikutus:

Infektioriski

Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen Litfulo-hoitoa ja sen aikana, jos:

- sinulla on jokin infektio tai sinulla on infektioita usein. Kerro lääkärille, jos sinulle ilmaantuu oireita, kuten kuumetta, haavoja, olet tavanomaista väsyneempi tai jos sinulla on hammasvaivoja, sillä ne voivat olla merkkejä infektiosta.
- sairastat tuberkuloosia tai olet aiemmin sairastanut tuberkuloosin tai olet ollut tuberkuloosia sairastavan henkilön läheisyydessä

tai jos asut tai matkustat alueilla, joilla tuberkuloosi on hyvin yleinen. Lääkäri tekee sinulle tuberkuloositestin ennen Litfulo-hoidon aloittamista ja saattaa tehdä testin uudelleen hoidon aikana.

- sinulla on joskus ollut herpesvirusinfektio (vesirokko tai vyöruusu), sillä se voi uusiutua Litfulo-hoidon aikana. Kerro lääkärille, jos sinulle ilmaantuu kivuliasta ihottumaa, johon liittyy rakkuloita, sillä se voi olla vyöruusun oire.

Rokotukset:

Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa, jos olet hiljattain saanut rokotuksen tai suunnittelet rokotuksen ottamista, sillä tiettyjä rokotteita (esim. tuberkuloosi- ja vesirokkorokote sekä MPR eli tuhkarokko-, vihurirokko- ja sikotautirokote) ei suositella juuri ennen Litfulo-hoitoa tai hoidon aikana.

Syöpäriski:

Litfuloa käyttäneillä potilailla on havaittu ei-melanoottista ihosyöpää. Lääkäri saattaa suositella, että käyt Litfulo-hoidon aikana säännöllisesti ihotutkimuksissa. Jos hoidon aikana tai sen jälkeen ilmaantuu uusia ihomuutoksia tai jos aiempien ihomuutosten ulkonäkö muuttuu, kerro siitä lääkärille.

Laskimoissa tai keuhkoissa ilmenevien veritulppien riski:

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle ennen Litfulo-hoitoa ja sen aikana, jos:

- sinulla on aiemmin ollut veritulppa jalassa (syvä laskimotukos) tai keuhkoissa (keuhkoveritulppa) tai sinulla on tavanomaista suurempi niiden kehittymisen riski (esimerkiksi jos olet äskettäin ollut suuressa leikkauksessa, jos käytät hormonaalista ehkäisyä / hormonikorvaushoitoa, jos sinulla tai lähisukulaisellasi on todettu hyytymishäiriö). Lääkäri kertoo, sopiiko Litfulo sinulle.

Kerro lääkärille, jos sinulle ilmaantuu äkillisesti hengenahdistusta tai hengitysvaikeuksia, rintakipua tai yläselkäkipua, jalkojen tai käsivarsien turvotusta, jalkojen kipua tai aristusta tai jalkojen tai käsivarsien punoitusta tai värimuutoksia, sillä ne voivat olla merkkejä veritulpista.

Sydänsairauden riski:

Kerro lääkärille tai apteekin henkilökunnalle ennen hoitoa ja sen aikana, jos

- sinulla on tai on ollut sydänvaivoja.

Hakeudu välittömästi lääkärin hoitoon, jos sinulle ilmaantuu voimakasta rintakipua tai puristavaa tunnetta rinnassa (joka voi säteillä käsivarsiin, leukaan, kaulaan ja selkään), hengenahdistusta, kylmää hikeä, pyörrytystä tai äkillistä huimausta, sillä nämä voivat olla sydänkohtauksen merkkejä.

Neurologisten oireiden riski:

Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen Litfulo-hoitoa sekä hoidon aikana, jos sinulla on selittämättömiä hermostoon liittyviä oireita Litfulo-hoidon aikana.

Ehkäisy ja raskaus

Litfuloa EI saa käyttää raskauden aikana.
Jos olet nainen, joka voi tulla raskaaksi, sinun pitää käyttää tehokasta ehkäisymenetelmää Litfulo-hoidon aikana ja vähintään kuukauden ajan viimeisen Litfulo-annoksen jälkeen. Keskustele lääkärin kanssa sopivista ehkäisymenetelmistä.
Kerro lääkärille heti, jos tulet raskaaksi tai epäilet tulleesi raskaaksi hoidon aikana, sillä Litfulo voi vahingoittaa sikiötä.

Versionumero: 2.0 Fimean hyväksymispäivämäärä: 16.10.2026

PP-LGF-FIN-0027-29102026