

Litfulo (ritlesitinibi) POTILASKORTTI



Tähän lääkevalmisteeseen kohdistuu lisäseuranta.
Tällä tavalla voidaan havaita nopeasti turvallisuutta
koskevaa uutta tietoa.

Versio: 1.0 | Hyväksytty: 19.10.2023

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskukseen Fimeaan

www-sivusto: www.fimea.fi

*Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus
Fimea
Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri
PL 55
FI-00034 FIMEA*

tai

Pfizer Oy:n puhelinvaihteen (09-430 040) kautta.

Nimesi: _____

Litfulo-valmistetta määränneen lääkärin nimi:

Lääkärin puhelinnumero: _____

Litfulo-hoidon aloituspäivä: _____

Litfulo-hoitoa koskevaa turvallisuustietoa potilaalle

- Tässä kortissa on tärkeitä turvallisuustietoja, joista sinun pitää olla tietoinen ennen Litfulo-hoitoa ja sen aikana.
- Lisätietoja on pakkausselosteessa, joka sisältyy jokaiseen Litfulo-pakkaukseen.
- Kysy lääkäriltä tai apteekkihenkilökunnalta, jos jokin asia on epäselvä.

Pidä tämä kortti aina mukanas ja näytä se kaikille hoitoosi osallistuville terveydenhuollon ammattilaisille – esimerkiksi apteekkihenkilökunnalle tai päivystyspoliklinikan lääkärille.

Mitä Litfulo on ja mihin sitä käytetään:

Litfulo sisältää vaikuttavana aineena ritlesitinibiä. Sitä käytetään vaikean pälvikaljun hoitoon aikuisille ja vähintään 12-vuotiaille nuorille. Pälvikalju on sairaus, jossa immuunijärjestelmä hyökkää elimistön omia soluja vastaan ja aiheuttaa karvatupen tulehduksen,

joka johtaa hiusten tai karvojen irtoamiseen päänahan, kasvojen ja/tai muiden ruumiinosien alueelta.

Litfulo vaikuttaa vähentämällä karvatupen tulehdusprosessiin osallistuvien entsyymien, Janus-kinaasi 3:n ja TEC-kinaasien, toimintaa. Tämä vähentää tulehdusta ja edistää siten hiusten takaisinkasvua päivikaljua sairastavilla potilailla.

Sinun on oltava tietoinen tietyistä haittavaikutuksista ja jäljempänä luetelluista tärkeistä asioista. Kerro lääkärille, jos sinulle ilmaantuu jokin haittavaikutus:

Infektioriski

Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen Litfulo-hoitoa ja sen aikana, jos:

- sinulla on jokin infektio (oireita voivat olla esimerkiksi kuume, hikoilu, vilunväristykset, lihaskivut, yskä, hengenhädistys, verta ysköksissä, painonlasku, ripuli, vatsakivut, kirvely virtsatessa, lisääntynyt virtsaamistarve, voimakas väsymys)
- sairastat tuberkuloosia tai olet aiemmin sairastanut tuberkuloosin tai olet ollut tuberkuloosia sairastavan henkilön läheisyydessä

tai jos asut tai matkustat alueilla, joilla tuberkuloosi on hyvin yleinen. Lääkäri tekee sinulle tuberkuloositestin ennen Litfulo-hoidon aloittamista ja saattaa tehdä testin uudelleen hoidon aikana.

- sinulla on joskus ollut herpesvirusinfektio (vesirokko tai vyöruusu), sillä se voi uusiutua Litfulo-hoidon aikana. Kerro lääkärille, jos sinulle ilmaantuu kivuliasta ihottumaa, johon liittyy rakkuloita, sillä se voi olla vyöruusun oire.

Rokotukset:

Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa, jos olet hiljattain saanut rokotuksen tai suunnittelet rokotuksen ottamista, sillä tiettyjä rokotteita (esim. tuberkuloosi- ja vesirokkorokote sekä MPR eli tuhkarokko-, vihurirokko- ja sikotautirokote) ei suositella juuri ennen Litfulo-hoitoa tai hoidon aikana.

Syöpäriski:

Ei tiedetä, lisääkö Litfulo syöpäriskiä. Lääkäri keskustelee kanssasi siitä, onko tämä lääke tarpeen ja tarvitaanko hoidon aikana tarkastuksia, mukaan lukien säännölliset ihon tarkastukset.

Laskimoissa tai keuhkoissa ilmenevien veritulppien riski:

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos:

- sinulla on ollut veritulppa jalassa (syvä laskimotukos) tai keuhkoissa (keuhkoveritulppa). Kerro lääkärille, jos sääresi on kivulias ja turvonnut, sinulla on rintakipu ja tai hengenahdistusta, koska nämä voivat olla merkkejä veritulpista laskimoissa.
- sinulla on ollut valtimotukos silmässä (verkkokalvon valtimotukos) tai sydämessä (sydänkohtaus). Kerro lääkärille, jos sinulla ilmenee

äkillisiä näkökyvyn muutoksia (näön hämärtyminen, osittainen tai täydellinen näönmenetys), rintakipua, hengenahdistusta, sillä nämä voivat olla valtimotukoksen merkkejä.

Neurologisten oireiden riski:

Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen Litfulo-hoitoa sekä hoidon aikana, jos sinulla on selittämättömiä hermostoon liittyviä oireita Litfulo-hoidon aikana.

Ehkäisy ja raskaus

Litfuloa EI saa käyttää raskauden aikana.

Jos olet nainen, joka voi tulla raskaaksi, sinun pitää käyttää tehokasta ehkäisymenetelmää Litfulo-hoidon aikana ja vähintään kuukauden ajan viimeisen Litfulo-annoksen jälkeen. Keskustele lääkärin kanssa sopivista ehkäisymenetelmistä.

Kerro lääkärille heti, jos tulet raskaaksi tai epäilet tulleesi raskaaksi hoidon aikana, sillä Litfulo voi vahingoittaa sikiötä.

Versio: 1.0 | Hyväksytty: 19.10.2023

PP-LGF-FIN-0002-27102023