

# Litfulo (ritlecitinib) PATIENTKORT



Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning.  
Detta kommer att göra det möjligt att snabbt  
identifiera ny säkerhetsinformation.

Version: 1.0 | Godkänt: 19.10.2023

## Rapportering av biverkningar

*Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Du kan också rapportera biverkningar för Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea*

*webbplats: [www.fimea.fi](http://www.fimea.fi)*

*Säkerhets- och utvecklingscentret för  
läkemedelsområdet Fimea  
Biverkningsregistret  
PB 55  
00034 FIMEA*

*eller*

*per telefon till Pfizer Oy (09-430 040).*

Ditt namn: \_\_\_\_\_

Läkarens namn (som förskrivit Litfulo):

\_\_\_\_\_

Läkarens telefonnummer: \_\_\_\_\_

Datumet då behandling med Litfulo påbörjades:

\_\_\_\_\_

## **Säkerhetsinformation till patienter om Litfulo**

- Detta kort innehåller viktig säkerhetsinformation som du ska känna till före och under behandling med Litfulo.
- För mer information, läs bipacksedeln som medföljer varje förpackning med Litfulo.
- Fråga din läkare eller apotekspersonal om något i informationen känns ottydligt.

**Ha detta kort med dig och visa det för all hälso- och sjukvårdspersonal som du behandlas av.**

## **Vad Litfulo är och vad det används för**

Litfulo innehåller den aktiva substansen ritlecitinib. Det används för att behandla svår alopecia areata hos vuxna och ungdomar från 12 års ålder. Alopecia areata är en sjukdom där kroppens eget immunsystem angriper hårsäckar, vilket orsakar inflammation som leder till håravfall i hårbotten, ansiktet och/eller på andra delar av kroppen.

Litfulo verkar genom att minska aktiviteten hos kinasenzymer (JAK3 och TEC) som är involverade i inflammationen i hårsäcken. Då minskar inflammationen, vilket leder till att håret växer ut igen hos patienter med alopecia areata.

**Du bör känna till vissa biverkningar och informationen som anges nedan. Tala med din läkare om du får några biverkningar:**

## **Risk för infektioner**

***Tala med läkare eller apotekspersonal före och under behandling med Litfulo om du:***

- har en infektion (möjliga tecken kan vara feber, svettningar, frossa, muskelvärk, hosta, andfåddhet, blod i slem från de övre luftvägarna, viktnedgång, diarré, magsmärtor, svidande känsla när du kissar, att du kissar oftare än vanligt, att du känner dig mycket trött).
- har eller har haft tuberkulos eller har varit i nära kontakt med någon som har tuberkulos, eller



om du bor eller reser i områden där tuberkulos är mycket vanligt. Din läkare testar dig för tuberkulos innan du börjar ta Litfulo och kan testa dig igen under behandlingen.

- någon gång har haft en herpes zoster-infektion (exempelvis vattkoppor eller bältros), eftersom din läkare om du får smärtsamma hudutslag med blåsor, eftersom det kan vara ett tecken på bältros.

## **Vacciner**

Tala med din läkare eller med apotekspersonal om du nyligen har vaccinerats eller planerar att vaccinera dig. Detta beror på att vissa levande försvagade vacciner (t.ex. vaccin mot tuberkulos och vaccin mot vattkoppor samt MPR-vaccin som skyddar mot mässling, röda hund och påssjuk) inte rekommenderas omedelbart före och under behandling med Litfulo.

## **Risk för cancer**

Det är inte klart om Litfulo ökar risken för cancer och din läkare kommer att diskutera med dig om behandling med detta läkemedel är lämpligt och om

kontroller, bland annat regelbundna hudkontroller, behövs under behandlingen.

### **Risk för blodproppar i vener eller lungor**

Tala med din läkare eller apotekspersonal om du:

- har haft blodproppar i venerna i benen (djup ventrombos) eller lungorna (lungemboli). Tala om för din läkare om du får smärta och svullnad i ett ben, bröstsmärta eller andfåddhet, eftersom det kan vara tecken på blodproppar i venerna.
- har haft blodproppar i en ögonartär (retinal ocklusion) eller hjärtat (hjärtinfarkt). Tala om

för din läkare om du får akuta förändringar av synen (dimsyn, partiell eller fullständig synförlust), bröstsmärta eller andfåddhet, eftersom dessa förändringar kan vara tecken på blodproppar i artärer.

### **Risk för neurologiska symtom**

Tala med din läkare eller apotekspersonal före och under behandlingen om du får oförklarliga symtom som orsakas av problem med nervsystemet medan du tar Litfulo.

## **Preventivmedel och graviditet**

Litfulo ska INTE användas under graviditet.

Om du är kvinna i fertil ålder ska du använda ett effektivt preventivmedel under behandling med Litfulo och i minst en månad efter den sista dosen. Din läkare kan ge dig råd om lämpliga preventivmetoder.

Tala omedelbart med din läkare om du blir gravid eller tror att du kan ha blivit gravid under behandlingen eftersom Litfulo kan skada fostret.

Version: 1.0 | Godkänt: 19.10.2023

PP-LGF-FIN-0003-27102024