Litfulo
(ritlecitinib)
PATIENTKORT

▼ Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation.

Version: 2.0 | Godkänt av Fimea: 16.10.2026

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Du kan också rapport era biverkningar för Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea

webbplats: www.fimea.fi
Säkerhets- och utvecklingscentret för
läkemedelsområdet Fimea
Biverkningsregistret PB 55
00034 FIMEA

eller

per telefon till Pfizer Oy (09-430 040) eller via
portalen (www.pfizersafetyreporting.com).

Ditt namn: _____

Läkarens namn (som förskrivit Litfulo):

_____

Läkarens kontaktuppgifter: _____

Datumet då behandlingen med Litfulo påbörjades:

_____

Säkerhetsinformation till patienter om Litfulo

- Detta kort innehåller viktig säkerhetsinformation som du ska känna till före och under behandling med Litfulo.
- För mer information, läs bipacksedeln som medföljer varje förpackning med Litfulo.
- Fråga din läkare eller apotekspersonal om något i informationen känns otydligt.

Ha detta kort med dig och visa det för all hälso - och sjukvårdspersonal som du behandlas av - till exempel apotekspersonal eller läkare på akutmottagningen.

Vad Litfulo är och vad det används för

Litfulo innehåller den aktiva substansen ritlecitinib. Det används för att behandla svår alopecia areata hos vuxna och ungdomar från 12 års ålder. Alopecia areata är en sjukdom där kroppens eget immunsystem angriper hårsäckar, vilket orsakar inflammation som leder till håravfall i hårbotten, ansiktet och/eller på andra delar av kroppen.

Litfulo verkar genom att minska aktiviteten hos kinasenzymer (JAK3 och TEC) som är involverade i inflammationen i hårsäcken. Då minskar inflammationen, vilket leder till att håret växer ut igen hos patienter med alopecia areata.

Du bör känna till vissa biverkningar och informationen som anges nedan. Tala med din läkare om du får några biverkningar:

Risk för infektioner

Tala med läkare eller apotekspersonal före och under behandling med Litfulo om du:

- har en infektion eller om du ofta får infektioner. Tala om för din läkare om du får symtom som feber, sår, känner dig tröttare än vanligt eller får tandbesvär eftersom det kan vara tecken på infektion.
- har eller har haft tuberkulos eller har varit i nära kontakt med någon som har tuberkulos, eller om du bor eller reser i områden där tuberkulos är mycket vanligt. Din läkare testar dig för tuberkulos innan du börjar ta Litfulo och kan testa dig igen under behandlingen.

- någon gång har haft en herpes zoster-infektion (exempelvis vattkoppor eller bältros), eftersom din läkare om du får smärtsamma hudutslag med blåsor, eftersom det kan vara ett tecken på bältros.

Vacciner

Tala med läkare eller apotekspersonal om du nyligen har vaccinerats eller planerar att vaccinera dig. Detta beror på att vissa levande försvagade vacciner (t.ex. vaccin mot tuberkulos och vaccin mot vattkoppor samt MPR-vaccin som skyddar mot mässling, röda hund och påssjuk) inte rekommenderas omedelbart före och under behandling med Litfulo.

Risk för cancer

Hudcancer som inte är melanom har observerats hos patienter som tar Litfulo. Din läkare kan rekommendera att du får regelbundna hudundersökningar medan du tar Litfulo. Tala om för läkaren om nya hudlesioner (hudförändringar) uppträder under eller efter behandlingen eller om befintliga hudlesioner ändrar utseende.

Risk för blodproppar i vener eller lungor

Tala med läkare eller apotekspersonal före och under behandling med Litfuloom du:

- tidigare har haft blodproppar i venerna i benen (djup ventrombos) eller lungorna (lungemboli) eller har ökad risk för att utveckla detta (till exempel om du nyligen genomgått ett större ingrepp, om du använder hormonella preventivmedel/hormonersättningsbehandling eller om du eller en nära släkting har en koagulationsrubbning). Din läkare kommer att diskutera med dig om Litfulo är lämpligt för dig.

Tala om för din läkare om du plötsligt blir andfådd eller har svårt att andas eller om du får bröstsmärta eller smärta i övre delen av ryggen, svullnad i ett ben eller en arm, smärta eller ömhet i ett ben eller rodnad eller missfärgning av ett ben eller en arm eftersom det kan vara tecken på blodproppar i venerna.

Risk för hjärtsjukdom

Tala med läkare eller apotekspersonal före och under behandlingen om du:

- har eller har haft hjärtproblem.

- Sök genast läkarvård om du upplever kraftig bröstsmärta eller tryck över bröstet (som kan sprida sig till armar, käke, hals och rygg), andfåddhet, kallsvettning, svimningskänsla eller plötslig yrsel, eftersom det kan vara tecken på en hjärtinfarkt.

Risk för neurologiska symtom

Tala med läkare eller apotekspersonal före och under behandlingen om du får oförklarliga symtom som orsakas av problem med nervsystemet medan du tar Litfulo.

Preventivmedel och graviditet

Litfulo ska INTE användas under graviditet.

Om du är fertil kvinna ska du använda ett effektivt preventivmedel under behandling med

Litfulo och i minst en månad efter den sista dosen. Din läkare kan ge dig råd om lämpliga preventivmetoder.

Tala omedelbart med din läkare om du blir gravid eller tror att du kan ha blivit gravid under behandlingen eftersom Litfulo kan skada fostret.

Version: 2.0 | Godkänt av Fimea: 16.10.2026

PP-LGF-FIN-0028-29102026