

DUODOPA[®]-HOIDON YLLÄPITO

Tämä kysymyslista on tarkoitettu hoitohenkilökunnan avuksi potilaan Duodopa-hoidon seurantaan. Potilaiden olisi hyvä seurata oireitaan ja kirjata niitä ylös 2–3 päivän ajan ennen vastaanottokäyntiä tai sairaalan ohjeiden mukaisesti.

Potilaiden tarpeet vaihtelevat yksilöllisesti, joten seuranta-aikataulu ja kysymykset on sovitettava kunkin potilaan tilanteeseen.

Kotiutuksesta kulunut aika	Soitto	Vastaanottokäynti
Yksi viikko	✓	
Yksi kuukausi		✓
Kolme kuukautta		✓
Kuusi kuukautta		✓

LAITTEEN JA LETKUJEN KÄSITTELY

Laite	1 vko	1 kk	3 kk	6 kk	Huomioitavaa
Osaatko käynnistää ja sammuttaa laitteen ja ottaa tarvittaessa lisäannoksen?					
Osaatko yhdistää lääkekasetin laitteeseen ja liittää sen PEG/J-letkuun?					
Onko laitteessa ollut hälytyksiä?					
Oletko vaihtanut laitteeseen paristot?					
Letkut					
Pystytkö huuhtelemaan sisäletkun ja sivuhaaran?					
Ovatko PEG/J-letku ja liittimet kunnossa?					

Lisätietoja laitteen käytöstä ja tavallisimmista hälytyksistä löydät oppaasta 4 Duodopa-laitteen käyttö.

ANNOSTEN VAIKUTUS

Päivä	1 vko	1 kk	3 kk	6 kk	Huomioitavaa
Miten aamuannos vaikuttaa?					
Miten lisäannokset vaikuttavat?					
Miten jatkuva infuusio toimii päivän aikana?					
Montako lisäannosta tarvitset päivässä?					
Yö					
Miten yösi sujuvat?					
Otatko tablettimuotoisia Parkinson lääkkeitä iltaisin tai öisin?					
Onko sinulla painajaisia / vilkkaita unia?					

AbbVie Oy

Duodopa[®]-hoidon ylläpito

Koulutusmateriaali riskien minimoimiseksi

RMP versio 7.2. FI-DUOD-190050/RMP/17.12.2020

Copyright © 2020 AbbVie. Kaikki oikeudet pidätetään.

Annosten hallinta	1 vko	1 kk	3 kk	6 kk	Huomioitavaa
Oletko muuttanut jotakin annosta – aamu-annosta, jatkuvaa infuusiota tai lisäännosta?					
Jos olet, mitä annoksia ja miten usein?					
Käytätkö muita Parkinson lääkkeitä Duodopan lisäksi?					
Sosiaalinen elämä ja mieliala					
Kerro sosiaalisesta elämästäsi.					
Onko toimintakykysi muuttunut? Pystytkö nyt tekemään asioita, jotka eivät aiemmin onnistuneet?					
Millainen on mielialasi?					

Lisätietoja annosten muuttamisesta löydät oppaasta 4 Duodopa-laitteen käyttö.

AVANTEEN HOITO JA KANTOVÄLINEIDEN KÄYTTÖ

Avanne	1 vko	1 kk	3 kk	6 kk	Huomioitavaa
Miltä avanne näyttää?					
Onko se puhdas?					
Onko se kuiva?					
Onko punoitusta, turvotusta tai onko se ärtynyt?					
Onko sinulla vatsakipua?					
Kantovälineet					
Mitä kantovälineitä käytät?					
Ovatko kantovälineet sopivia ja käytännöllisiä?					
Tiedätkö, mistä saat tilattua kantovälineitä?					
Muuta					
Oletko hakenut hoitotarvikejakelusta tarvikkeita?					
Onko sinulla lääkärin antama todistus hoidosta (Treatment Certificate)?					
Tiedätkö, mihin voit ottaa yhteyttä, jos sinulla on kysyttävää hoidosta tai ongelmia hoidon suhteen?					

Lisätietoja avanteen ja PEG/J-letkun hoidosta löydät oppaasta 3 Duodopa-hoidon aloitus.

Lisätietoja kantovälineistä löydät oppaasta 2 Elämää Duodopan kanssa.

Duodopa on tarkoitettu edenneen levodopaan reagoivan Parkinsonin taudin hoitoon, johon liittyy vaikeita motorisia tilanvaihteluja ja hyper-/dyskinesiaa, eivätkä saatavilla olevat Parkinsonin taudin lääkkeiden yhdistelmät tuota tyydyttäviä tuloksia. Duodopa on geeli, joka annostellaan jatkuvana infuusiona laitteen (CADD-Legacy 1400 pumppu) ja letkujen kautta ohutsuoleen.

AbbVie Oy

Duodopa®-hoidon ylläpito

Koulutusmateriaali riskien minimoimiseksi

RMP versio 7.2. FI-DUOD-190050/RMP/17.12.2020

Copyright © 2020 AbbVie. Kaikki oikeudet pidätetään.