

Potilaskortti

Venclyxto[®]-valmisteseen (venetoklaksiin) liittyvää turvallisuustietoa kroonista lymfaattista leukemiaa (KLL) sairastaville potilaille

Venclyxto[®]-valmistetta käytetään KLL-potilaiden hoitoon. Tässä kortissa on tärkeää tietoa tuumorilyysioireyhtymästä ja Venclyxto[®]-valmisteesta.



- Pidä tämä potilaskortti aina mukanasasi.
- Näytä kortti kaikille hoitoosi osallistuville lääkäreille ja jos hakeudut päivystykseen.
- Ota Venclyxto[®] juuri siten kuin lääkärisi on määrännyt.

Tietoa tuumorilyysioireyhtymästä

Hoidon aikana eräiden elimistön suolojen (esim. kaliumin ja virtsahapon) pitoisuudet veressä saattavat suurentua. Tämä saattaa johtaa tuumorilyysioireyhtymään ensimmäisten 5 hoitoviikon aikana.

Tuumorilyysioireyhtymän oireita:

- kuume tai vilunväristykset
- pahoinvointi tai oksentelu
- sekavuus
- hengenahdistus
- sydämen rytmihäiriöt
- tumma tai samea virtsa
- epätavallisen voimakas väsymys
- lihas- tai nivelkipu
- kouristelu tai kouristuskohtaukset
- vatsakipu ja vatsan turvotus.

Jos havaitset tuumorilyysioireyhtymän oireita

Jos havaitset hoidon aikana mitä tahansa tuumorilyysioireyhtymän oireista,



soita lääkärillesi tai hakeudu lääkärin hoitoon välittömästi ja



lopeta Venclyxto®-valmisteen ottaminen.

Lue lisätietoja pakkausselosteesta.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen: Voit ilmoittaa haittavaikutuksista Fimealle tai myyntiluvan haltijan paikalliselle edustajalle (AbbVie Oy).

AbbVie Oy
p. 010 2411 200
www.abbvie.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea
Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri
PL 55, 00034 FIMEA | www.fimea.fi

Näin pienennät tuumorilyysioireyhtymän riskiä



Juo vähintään **1,5–2 litraa vettä päivässä:**

- ✓ aloittaen 2 päivää ennen ensimmäistä annosta, ja
- ✓ päivänä, jona otat ensimmäisen annoksen, ja
- ✓ joka päivä ensimmäisten 5 hoitoviikon ajan. Runsas vedenjuonti auttaa poistamaan verestä suurina pitoisuuksina esiintyviä suoloja virtsaan.



Käy **verikokeissa** sovitusti, sillä verikoetulokset auttavat lääkäriäsi tunnistamaan mahdollisen tuumorilyysioireyhtymän.



Ennen Venclyxto®-hoidon aloittamista käytä lääkärisi määräämää toista lääkettä, joka ehkäisee erään veren suolan (virtsaahapon) kertymistä elimistöön.



Tärkeää turvallisuustietoa terveydenhuollon ammattilaisille Venclyxto[®]-valmisteesta ja tuumorilyysioireyhtymästä

Tämä potilas käyttää KLL:n hoitoon Venclyxto[®]-valmistetta, joka voi aiheuttaa tuumorilyysioireyhtymän ensimmäisten 5 hoitoviikon aikana.

- ✓ Arvioi veren kemiallinen koostumus: kalium, virtsahappo, fosfori, kalsium ja kreatiniini.
- ✓ Veren kemialliset poikkeavuudet on korjattava kiireellisesti. **Korjaamatta jättäminen voi johtaa kuolemaan.**
- ✓ Jos epäilet tuumorilyysioireyhtymää, ota välittömästi yhteys tässä kortissa mainittuun lääkkeen määränneeseen lääkäriin.

Lisätietoja saa valmisteyhteenvedosta tai AbbVielta (p. 010 2411 200). AbbVielta saa myös lisää potilaskortteja tarvittaessa.

Tärkeät yhteystiedot

Nimeni:

Yhteyshenkilö hätätilanteita varten (nimi ja puhelinnumero):

Venclyxto[®]-valmisteen määränneen lääkärin nimi:

Lääkärin yhteystiedot (puhelinnumero):