

Produodopa[®]

(foslevodopa/foskarbidopa)

edenneen Parkinsonin taudin hoitoon

Tämä potilasopas sisältää tärkeitä turvallisuustietoja, joista sinun tulee olla tietoinen.

Pidä opas saatavilla, kun valmistaudut käyttämään lääkettä.

abbvie

Miksi tämä potilasopas kannattaa lukea?

Produodopa-lääke on tarkoitettu edenneen Parkinsonin taudin oireiden hoitoon.

Sitä käytetään, kun muut lääkkeet eivät enää tehoa taudin oireisiin riittävästi.

Voit antaa lääkkeen itsellesi, tai lääkkeen voi antaa sinua avustava henkilö. Lääke annetaan ihon alle pienellä muoviputkella (kanyylillä) navan ympärillä olevalle alueelle. Ihon aluetta, johon kanyyli on kiinnitetty, kutsutaan infuusiokohdaksi.

Lääkettä kulkeutuu kanyylin kautta elimistöön jatkuvasti, 24 tuntia vuorokaudessa.

Osalle lääkkeen käyttäjistä voi ilmaantua ihovaivoja infuusiokohdassa.

Näitä voivat olla:

- **Ihoinfektio.** Tällöin ihoon on päässyt jokin taudinaiheuttaja.

Ihoinfektio voi muuttua vakavaksi, jos taudinaiheuttaja pääsee verenkiertoon ja infektiio leviää kaikkialle elimistöön. Tätä kutsutaan verenmyrkytykseksi (sepsis).

- **Ihoreaktio.** Tällöin iho on ärtynyt tai tulehtunut.

Tässä potilasoppaassa sinulle ja sinua avustavalle henkilölle kerrotaan:



infuusiokohdan valinnasta



infuusiokohdan infektion ja reaktion tunnistamisesta



infuusiokohdan infektion ja reaktion riskin pienentämisestä



miten toimia infuusiokohdan infektion tai reaktion ilmaannuttua



mistä saat lisätietoa lääkkeestäsi.



Infuusiokohdan valinta

Infuusiokohtaa on tärkeää vaihtaa säännöllisesti. Tämä edistää ihon pysymistä terveenä ja mahdollistaa lääkkeen oikeanlaisen annostelun.

Voit käyttää infuusiokohtana vatsan aluetta, ellei lääkäri kehota käyttämään jotakin muuta kohtaa. Muista valita infuusiokohta vähintään 5 cm:n (suunnilleen pikkusormen pituisen mitan) etäisyydeltä navasta.


- Vältä vyölinjaa, sillä vyön aiheuttama paine ihoa vasten voi ärsyttää tätä aluetta.
- Vältä ihoa, joka on arpeutunut, kovettunut tai jossa on arpijuovia.
- Vältä ihopoimuja tai uurteita, joiden kohdalta vartalo luontaisesti taipuu paljon.
- Ota käyttöön uusi infuusiosetti (kanyyli ja infuusioletku) aina, kun vaihdat infuusiokohtaa.

Vaihda infuusiokohtaa 3 päivän välein tai useammin riippuen ihomuutoksista (esim. punoitus, turvotus ja kipu).

Uuden infuusiokohdan on oltava vähintään 2,5 cm:n (suunnilleen kahden sormen levyisen mitan) etäisyydellä edellisestä infuusiokohdasta.

Älä käytä samaa infuusiokohtaa ainakaan 12 päivään. Näin iho pääsee paranemaan täysin.

On olemassa erilaisia keinoja, joiden avulla muistat, ettet käytä samaa infuusiokohtaa liian pian. Voit esimerkiksi kuvitella, että vatsasi on kellotaulu. Aseta kanyyli joka kerta eri "kellonajan" kohdalle siten, että käytät kahden tunnin välejä. Valitse esimerkiksi ensimmäinen infuusiokohta klo 12:n kohdalta, seuraava klo 2:n kohdalta, seuraava klo 4:n kohdalta jne.




Merkitse muistiin infuusiokohtien päivämäärät ja paikat.



Infuusiokohdan infektion ja reaktion tunnistaminen

Tarkkaile ihomuutosten varalta kohtaa, jossa kanyyli menee ihoon. Ihomuutoksia voi esiintyä kuumeen kanssa tai ilman ja muutosten ilmenemismuotoja voivat olla:

- punoitus
- lämmöntunne
- turvotus
- arkuus/kipu
- ihon värin muutos, kun painat ihoa.





Infuusiokohdan infektion ja reaktion riskin pienentäminen

Infuusiokohdan infektiota tai reaktioita voi esiintyä. Jäljempänä olevat seikat on otettava huomioon infuusion käsittelyssä.



Valmistele infuusio hyvin valaistulla, puhtaalla ja tasaisella pinnalla (kuten pöydällä).



Pidä infuusiokohta ja infuusiopöytä puhtaana ja steriilinä, kun valmistele infuusiota.



Pese kädet aina vedellä ja saippualla ja kuivaa ne paperipyyhkeeseen. Älä kosketa tämän jälkeen mitään epäpuhdasta.



Vältä epäpuhtaan pinnan koskettamista ruiskun kärjellä, injektiopullon adapterilla, infuusiopöydällä tai infuusiopöydän kanyylin liittimellä.



Hävitä huolellisesti käytetyt tarvikkeet, jotka voivat olla likaantuneet.



Kun olet valinnut infuusiokohdan, pyyhi kohdan iho desinfiointipyyhkeellä. Muista pyyhkiä yhteen suuntaan, jotta et likaa puhdistettua kohtaa. Anna kohdan kuivua vähintään 1 minuutin ajan.

Vaihda infuusiokohtaa 3 päivän välein tai useammin riippuen ihomuutoksista (esim. punoitus, turvotus ja kipu)



Kun olet käyttänyt uutta infuusiokohtaa, älä käytä samaa infuusiokohtaa ainaakaan 12 päivään. Näin iho pääsee paranemaan täysin.



Uuden infuusiokohdan on oltava aina 2,5 cm:n (suunnilleen kahden sormen levyisen mitan) etäisyydellä edellisestä infuusiokohdasta.



Käytä aina uutta kanyyliä ja letkua, kun vaihdat infuusiokohtaa.



Leikkaa ihokarvat saksilla infuusiokohdan ympäriltä. Näin kanyylin kiinnitysteippi tarttuu ihoon paremmin. Jos sinun on ajeltava ihokarvasi, kohtaa voi käyttää infuusiokohtana aikaisintaan vuorokauden kuluttua.



Käytä mukavia vaatteita, jotka eivät ärsytä infuusiokohdan ihoa.



Miten toimia infuusiokohdan infektion tai reaktion ilmaannuttua

Vaihda infuusiokohtaa – älä odota kolmea päivää. Ota yhteys lääkäriin, sairaanhoitajaan tai apteekkihenkilökuntaan, jos sinulla on jokin seuraavista oireista:

- punoitus
- lämmöntunne
- turvotus
- arkuus/kipu
- ihon värin muutos, kun painat ihoa.

Infektoitunutta kohtaa saa käyttää uudelleen aikaisintaan 12 päivän kuluttua tai kun kohta on parantunut.



Lisätietoa lääkkeestäsi

Lisätietoa lääkkeestäsi saat pakkausselosteesta ja käyttöohjeista, jotka olet saanut Produodopa-lääkkeen mukana.

Jos havaitset haittavaikutuksia lääkkeen käytöstä, kerro niistä lääkärille, sairaanhoitajalle tai apteekkihenkilökunnalle. Voit ilmoittaa lääkkeen haittavaikutuksista myös Fimealle tai myyntiluvan haltijalle (AbbVie Oy).

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea
Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri
PL 55, 00034 FIMEA
www.fimea.fi

AbbVie Oy
p. 010 2411 200
www.abbvie.fi