

Produodopa[®]

(foslevodopa/foskarbidopa)

**för behandling av Parkinsons sjukdom
i komplikationsfas**

**Denna patientbroschyr innehåller viktig
säkerhetsinformation som du bör känna
till.**

**Ha broschyren nära till hands när
du förbereder dig för att använda
läkemedlet.**

abbvie

Varför ska jag läsa denna patientbroschyr?

Produodopa är avsett för behandling av symtom på Parkinsons sjukdom i komplikationsfas.

Det används när andra läkemedel inte längre har tillräcklig effekt på sjukdomssymtomen.

Du kan själv använda läkemedlet, eller alternativt kan det ges av en person som vårdar dig. Läkemedlet ges under huden via en liten plastslang (kanyl) i området runt naveln. Hudområdet där kanylen är fastsatt kallas infusionsställe.

Läkemedlet pumpas kontinuerligt in i kroppen via kanylen, 24 timmar i dygnet.

Hos en del av dem som använder läkemedlet kan hudbesvär uppkomma på infusionsstället.

Det kan handla om:

- **En hudinfektion.** Då har sjukdomsalstrare tagit sig in i huden.

En hudinfektion kan bli allvarlig om sjukdomsalstrarna når blodomloppet och sprider sig i hela kroppen. Detta kallas sepsis (blodförgiftning).

- **En hudreaktion.** Då är huden irriterad eller inflammerad.

Denna patientbroschyr ger dig och personen som vårdar dig information om:



hur du ska välja infusionsställe



hur du känner igen en infektion eller reaktion på infusionsstället



hur du kan minska risken för en infektion eller reaktion på infusionsstället



vad du ska göra om du får en infektion eller reaktion på infusionsstället



var du hittar mer information om ditt läkemedel.



Så väljer du infusionsställe

Det är viktigt att regelbundet byta infusionsställe. Det bidrar till att hålla huden frisk och till att läkemedlet tillförs på korrekt sätt.

Du kan välja infusionsställe på buken, såvida inte din läkare uppmanar dig att välja ett annat ställe. Kom ihåg att välja ett infusionsställe som ligger minst 5 cm (motsvarar ungefär längden på ditt lillfinger) från naveln.


- Undvik bälteslinjen eftersom trycket från ett bälte kan irritera huden på detta ställe.
- Undvik hudområden med ärr, förhårdnader eller bristningar.
- Undvik hudveck eller veck där kroppen böjs naturligt.
- Byt till ett nytt infusionsset (kanyl och infusions slang) varje gång du byter infusionsställe.

Byt infusionsställe var 3:e dag eller oftare, beroende på eventuella hudförändringar (t.ex. rodnad, svullnad och smärta).

Det nya infusionsstället ska vara lokaliserat minst 2,5 cm (ungefär två fingerbredder) från det senaste infusionsstället.

Använd inte samma infusionsställe på nytt på minst 12 dagar. På så sätt hinner huden läka ordentligt.

Du kan använda olika knep för att undvika att alltför snart använda samma infusionsställe på nytt. Ett sätt är att föreställa sig buken som en urtavla. Placera kanylen vid olika "klockslag" varje gång, med två "timmars" mellanrum. Välj till exempel klockan 12 som det första infusionsstället, sedan klockan 2, klockan 4 osv.




Anteckna datum och vilket infusionsställe du valt.



Så känner du igen en infektion eller reaktion på infusionsstället

Var uppmärksam på eventuella hudförändringar på stället där kanylen går genom huden. Hudförändringar kan förekomma med eller utan feber och innefatta:

- rodnad
- värmekänsla
- svullnad
- ömhet/smärta
- missfärgning av huden när du trycker på den.





Så kan du minska risken för en infektion eller reaktion på infusionsstället

Infektioner eller reaktioner på infusionsstället kan förekomma. Nedanstående instruktioner ska beaktas när infusionen ges.



Förbered infusionen på en väl upplyst, ren och plan yta (t.ex. ett bord).



Håll infusionsstället och infusionssetet rena och sterila medan du förbereder infusionen.



Tvätta alltid händerna med tvål och vatten och torka dem med en pappershandduk. Vidrör därefter inget som är smutsigt.



Låt inte sprutspetsen, injektionsflaskans adapter, infusionslangen eller infusionslangens kanylkoppling komma i kontakt med någon smutsig yta.



Kassera omsorgsfullt alla använda föremål som kan vara kontaminerade.



När du har valt infusionsställe, torka av huden på infusionsstället med en spritkompress. Kom ihåg att torka bara i en riktning så att du inte kontaminerar det rengjorda området. Låt hudområdet torka i minst 1 minut.

Byt infusionsställe var 3:e dag eller oftare, beroende på eventuella hudförändringar (t.ex. rodnad, svullnad och smärta)



När du använt ett nytt infusionsställe, välj inte samma ställe på nytt på minst 12 dagar. På så sätt hinner huden läka ordentligt.



Ett nytt infusionsställe ska alltid vara lokaliserat minst 2,5 cm (ungefär två fingerbredder) från det senaste infusionsstället.



Använd alltid en ny kanyl och slang när du byter infusionsställe.



Klipp bort eventuellt hår runt infusionsstället med en sax, så fäster kanylens tejp bättre på huden. Om du måste raka bort håret får du använda det rakade området som infusionsställe först efter ett dygn.



Använd bekväma kläder som inte irriterar huden på infusionsstället.



Gör så här om du får en infektion eller reaktion på infusionsstället

Byt infusionsställe – vänta inte i tre dagar. Kontakta läkare, sjukskötare eller apotekspersonal om du får något av följande symtom:

- rodnad
- värmekänsla
- svullnad
- ömhet/smärta
- missfärgning av huden när du trycker på den.

Du får använda ett infekterat område på nytt tidigast efter 12 dagar eller när det har läkt.



Mer information om ditt läkemedel

Mer information om ditt läkemedel hittar du i bipacksedeln och bruksanvisningen som du har fått med Produodopa-läkemedlet.

Om du får biverkningar, tala med läkare, sjukskötare eller apotekspersonal. Du kan också rapportera biverkningar av läkemedlet till Fimea eller till innehavaren av godkännandet för försäljning (AbbVie Oy).

Säkerhets- och utvecklingscentret för
läkemedelsområdet Fimea
Biverkningregistret
PB 55, 00034 FIMEA
www.fimea.fi

AbbVie Oy
Tel. 010 2411 200
www.abbvie.fi