

## Kun tarvitset lisätietoja:

- Keskustele lääkärisi, hoitajasi tai apteekkihenkilökunnan kanssa.
- Lue huolellisesti pakkausseloste, joka tulee lääkkeesi mukana.
- Soita Amphastar France Pharmaceuticals +358 75 3257709. Muina aikoina jätä viesti vastaajaan, niin palvelemme sinua mahdollisimman pian. Puhelu on sinulle maksuton.

## Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille, apteekkihenkilökunnalle tai sairaanhoitajalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan viranomaiselle (www-sivusto: [www.fimea.fi](http://www.fimea.fi), Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea, Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri, PL 55, FI-00034 Fimea). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa lääkevalmisteen turvallisuudesta.

Voit ilmoittaa Amphastarin tuotteeseen liittyvän haittavaikutuksen tai tuotevirheepäilyn sähköpostitse [gps@amphastar.com](mailto:gps@amphastar.com) tai soittamalla Amphastar France Pharmaceuticals: n puhelinvaihteeseen +358 75 3257709.

FIMEAn hyväksymä 25.3.2024

Amphastar France Pharmaceuticals  
Usine Saint Charles 60590 Eragny sur Epte,  
Ranska  
Puhelinvaihte: +358 75 3257709  
Tiedustelut: [gps@amphastar.com](mailto:gps@amphastar.com)

© 2024 Amphastar  
All rights reserved.

Baqsim<sup>®</sup> is a registered trademark of Amphastar

# baqsimi®



## VAIKEAN HYPOGLYKEMIAN HOITON

---

### KÄYTTÖAIHE

Baqsimi® on tarkoitettu vaikean hypoglykemian hoitoon aikuisille, nuorille ja 4 vuotta täyttäneille lapsille, joilla on diabetes mellitus.

## MITÄ BAQSIMI® ON

- Baqsimi® on nenään annosteltava glukagonijauhe. Glukagoni on luontainen hormoni, jota muodostuu haimassa. Glukagoni vaikuttaa päinvastoin kuin insuliini, eli se nostaa veren sokeripitoisuutta.
- Baqsimi® on käyttövalmis valmiste, joka ei vaadi sekoittamista. Kerta-annospakkaus sisältää vakioannoksen.
- Baqsimi®-valmiste ei vaadi sisäänhengitystä. **Baqsimi®-valmiste annetaan vaikean hypoglykemian hoitoon vaikka olisit tajuton, nenäsi olisi tukkoinen tai olisit ottanut jotain nenän tukkoisuutta lievittävää valmistetta.**
- Baqsimi®-valmistetta ei tarvitse säilyttää jääkaapissa. Valmiste tulee säilyttää alle 30°C lämpötilassa.
- **Tämä potilasohje perustuu Baqsimi®-valmisteen pakkauselosteeseen ja käyttöohjeeseen. Lue aina pakkausseloste ja käyttöohje huolellisesti ennen kuin aloitat Baqsimi®-valmisteen käytön.**

# MILLOIN BAQSIMI®-VALMISTETTA KÄYTETÄÄN

- Baqsimi®-valmistetta käytetään vaikean hypoglykemian (erittäin matalan verensokerin) hoitoon, kun potilas ei pysty syömään tai juomaan itse ja tarvitsee toisen apua.
- On tärkeää, että ympärilläsi olevat ihmiset tunnistavat hypoglykemian mahdolliset oireet, jotta he voivat tarvittaessa auttaa sinua.

Mahdollisia hypoglykemian oireita voivat olla:

- huimaus
- keskittymisvaikeus tai sekavuus
- kouristukset tai tajunnan menetys
- mielialan vaihtelut
- koordinaatiokyvyn heikentyminen
- vapina tai hikoilu

# MITEN BAQSIMI®-VALMISTETTA KÄYTETÄÄN

Lue Baqsimi®-valmisteen käyttöohjeet huolellisesti ennen käyttöä.

- Kerro perheenjäsenillesi ja ystävillesi, miten Baqsimi®-valmistetta käytetään. **Heidän on osattava käyttää Baqsimi®-valmistetta jo ennen kuin sitä tarvitaan.**
- **Älä** poista suojapäälystettä äläkä avaa koteloa ennen kuin olet valmis antamaan annoksen. Jos kotelo on avattu, lääkkeeseen on voinut joutua kosteutta, eikä lääke ehkä vaikuta oikein.
- **Älä** paina annospainiketta ennen nenään asettamista. Muussa tapauksessa kerta-annospakkauksessa oleva kerta-annos menee hukkaan.
- Baqsimi®-valmistetta ei tule käyttää pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän (EXP) jälkeen.

## Annoksen valmistelu:

- Poista suojapäälyste vetämällä punaisesta nauhasta.
- Avaa kansi ja ota kerta-annospakkaus kotelosta.



Säilytä kerta-annospakkaus suojapäälysteisessä kotelossa annoksen antamiseen asti.

# BAQSIMI<sup>®</sup>-VALMISTEEN ANNOSTELU

Annoksen antaminen:



- **PITELE** kerta-annospakkausta sormien välissä kuten kuvassa. **Älä paina annospainiketta ennen nenään asettamista.**



- **ASETA** kerta-annospakkauksen kärki toiseen sieraimeen.



- **PAINA** annospainike kokonaan pohjaan, **kunnes annospainikkeen vihreä viiva ei enää näy.**

# **BAQSIMI<sup>®</sup>-VALMISTEEN**

## **ANNOSTELU** (jatkuu)

### **Annoksen antamisen jälkeen:**

Jos potilas on tajuton, käännä hänet Baqsimi<sup>®</sup>-valmisteen antamisen jälkeen kylkiasentoon tukehtumisen estämiseksi.

### **Soita heti hätänumeroon 112.**

Kannusta potilasta syömään tai juomaan runsaasti sokeria sisältävää välipalaa, kuten makeisia tai hedelmämehua, mahdollisimman pian.

### **Hävitä käytetty kerta-annospakkaus ja kotelo.**

---

Voit katsoa Baqsimi<sup>®</sup>-valmisteen  
käyttöohjevideon osoitteessa  
**[www.baqsimi.eu](http://www.baqsimi.eu)**

---

# KERRO LÄHEISILLESII, ETTÄ SINULLA ON BAQSIMI®- VALMISTE MUKANASI.

Alla olevassa keltaisessa Baqsimi®-kortissa on ohjeita, miten toimia vaikeassa hypoglykemiassa. Pidä keltaista korttia mukanasii.

Kirjoitathan kortin tyhjään kohtaan, missä säilytät Baqsimi®-valmistetta.

**VAIKEASSA  
HYPOGLYKEMIASSA ETSI  
KELTAINEN KOTELO.**

**MINULLA ON  
DIABETES.  
VAIKEASSA  
HYPOGLYKEMIASSA  
EN PYSTY  
AUTTAMAAN  
ITSEÄNI.**

Etsi **pieni keltainen kotelo.**  
Säilytän sitä

Säilytä kerta-annospakkaus  
suojapäällysteisessä kotelossa annoksen  
antamiseen asti. Seuraa käyttöohjeita ja  
soita hätänumeroon 112.