

Potilaan nimi: \_\_\_\_\_

Teriflunomidin ensimmäinen määräämispäivä: \_\_\_\_\_

Sairaala: \_\_\_\_\_

Hoitavan lääkärin nimi: \_\_\_\_\_

Hoitavan lääkärin puhelinnumero hätätilanteisiin: \_\_\_\_\_

## TERIFLUNOMIDI POTILASKORTTI:

**Tämä potilaskortti sisältää tärkeää tietoa Teriflunomide Accord -valmisteen riskeistä. Säilytä potilaskortti turvallisessa paikassa ja näytä se kaikille sinua hoitaville lääkäreille ja terveydenhuollon ammattilaisille (esim. kiireellistä hoitoa vaativissa tilanteissa). Lue myös pakkausseloste lisätiedon saamiseksi.**

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille, apteekkihenkilökunnalle tai sairaanhoitajalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista Fimeaan:

[www.fimea.fi](http://www.fimea.fi)

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus

Fimea

Lääkkeiden haittavakutusrekisteri

PL 55

00034 FIMEA

tai

Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan myyntiluvan haltijalle:

Accord Healthcare Oy, Oksasenkatu 10 A 6,

00100 Helsinki,

email: [ra\\_finland@accord-healthcare.com](mailto:ra_finland@accord-healthcare.com), puh. 010 2314 180,

[www.accord-healthcare.com/fi/ilmoita-haittavaikutuksesta](http://www.accord-healthcare.com/fi/ilmoita-haittavaikutuksesta)

**accord**

## **Merkittävät haittavaikutukset**

Teriflunomidi vähentää immuunijärjestelmän aktiivisuutta. Joillakin henkilöille teriflunomidi voi aiheuttaa maksavaurion (hepatiitti) ja se voi myös vähentää infektioiden torjuntaa osallistuvien valkosolujen (neutrofiilien) ja veren hyytymiseen osallistuvien verihiutaleiden tuotantoa. Maksasi toimintaa osoittavat testit sekä verenpaineen mittaaminen tulisi tehdä säännöllisesti teriflunomidihoidon aikana ja täydellinen verenkuvatutkimus tulisi tehdä tarpeen mukaan. Nämä testit tulisi tehdä myös ennen hoidon aloittamista.

## **Jos sinulla on jokin seuraavista haittavaikutuksista, ota heti yhteyttä lääkäriin:**

- Ihon tai silmänvalkuaisten keltaisuutta (keltaisuus, keltatauti), selittämätöntä pahoinvointia tai oksentelua, vatsakipua tai normaalia tummempaa virtsaa. Nämä ovat merkkejä maksaongelmasta.
- Merkkejä infektiosta, mukaan lukien kuume, vilunväristykset, kipu virtsatessa tai sekavuus.

## **Naisille, jotka voivat tulla raskaaksi, mukaan lukien tytöt ja heidän vanhempansa/huoltajansa:**

- Teriflunomidia ei tule käyttää raskauden aikana tai naisilla, jotka voivat tulla raskaaksi, jos he eivät käytä luotettavaa ehkäisymenetelmää, koska teriflunomidi voi aiheuttaa vakavia sikiöön kohdistuvia haittoja.
- Älä aloita teriflunomidihoidoa, jos olet raskaana tai jos epäilet olevasi raskaana. Lääkäri saattaa pyytää sinua tekemään raskaustestin asian varmistamiseksi.
- Käytä luotettavaa ehkäisymenetelmää teriflunomidihoidon aikana. Kerro lääkärille, jos haluat vaihtaa ehkäisymenetelmää tai jos suunnittelet raskautta teriflunomidehoidon lopettamisen jälkeen. Keskustele lääkärin kanssa myös, jos suunnittelet imetystä tai imetät.
- Jos epäilet olevasi raskaana teriflunomidihoidon aikana tai kahden vuoden aikana valmisteen käytön lopettamisesta, ota välittömästi yhteyttä lääkäriin raskaustestin tekemiseksi. Jos testi vahvistaa sinun olevan raskaana, lääkäri saattaa ehdottaa hoitoa tietyillä lääkkeillä, jotka nopeuttavat teriflunomidin poistumista elimistöstäsi. Tämä voi vähentää sikiöön kohdistuvaa riskiä.
- Tyttöjen vanhempien tai huoltajien tulee olla yhteydessä tytön lääkäriin, kun tytön ensimmäiset kuukautiset alkavat, jotta hänelle voidaan antaa tietoa raskaudenaikaisista sikiöön kohdistuvista riskeistä ja ohjeistusta asianmukaisesta ehkäisystä.