

# POTILASKORTTI

## Dabigatran etexilate Orion (dabigatraanieteksilaatti)

- Tämän kortin on oltava aina potilaan tai potilasta hoitavan henkilön mukana
- Varmista, että käytössäsi on viimeisin versio

### HYVÄ POTILAS/LAPSIPOTILASTA HOITAVA HENKILÖ,

lääkärisi/lastasi hoitava lääkäri on aloittanut sinulle/lapsellesi Dabigatran etexilate Orion -hoidon. Tutustu pakkausselosteessa oleviin tärkeisiin ohjeisiin Dabigatran etexilate Orion -kapselien turvallisen käytön varmistamiseksi.

Tämä potilaskortti sisältää tärkeää tietoa lääkehoidostasi/lapsesi lääkehoidosta. Pidä sitä aina mukanasasi/lapsesi mukana, jotta terveydenhuollon ammattilaiset tietävät sinun/lapsesi käyttävän Dabigatran etexilate Orion -kapseleita.

### TIETOA POTILAILLE/LAPSIPOTILAITA HOITAVILLE HENKILÖILLE

#### Tietoa lääkehoidostasi/lapsesi lääkehoidosta

- Dabigatran etexilate Orion ohentaa verta. Sitä käytetään veritulppien hoitoon tai ehkäisemään vaarallisten veritulppien muodostumista.
- Seuraa lääkärisi/lastasi hoitavan lääkärin ohjeita kun käytät Dabigatran etexilate Orion -kapseleita. Älä koskaan jätä annoksia ottamatta tai lopeta Dabigatran etexilate Orion -kapselien käyttöä keskustelematta lääkärisi/lastasi hoitavan lääkärin kanssa.
- Kerro lääkärillesi/lastasi hoitavalle lääkärille kaikista lääkkeistä, joita parhaillaan käytät/joita lapsesi parhaillaan käyttää.
- Kerro lääkärillesi/lastasi hoitavalle lääkärille Dabigatran etexilate Orion -kapselien käytöstä ennen mitään kirurgisia tai elimistön sisälle ulottuvia toimenpiteitä.
- Dabigatran etexilate Orion -kapselit voidaan ottaa ruoan kanssa tai ilman. Kapseli niellään kokonaisena vesilasillisen kera. Kapselia ei saa rikkoa tai pureskella, eikä sen sisältöä saa tyhjentää.

#### Milloin on syytä hakeutua lääkäriin

- Dabigatran etexilate Orion -kapselien käyttö voi suurentaa verenvuotoriskiä. Ota välittömästi yhteyttä lääkäriin/lastasi hoitavaan lääkäriin, jos havaitset itselläsi/lapsellasi seuraavia mahdollisia verenvuodon merkkejä ja oireita: turvotus, epä-mukava olo, epätavallinen kipu tai päänsärky, huimaus, kalpeus, heikotus, epätavallinen mustelmien muodostus, verenvuoto nenästä, verenvuoto ikenistä, epätavallisen pitkään kestävä verenvuoto haavoista, poikkeava kuukautisvuoto tai verenvuoto emättimestä, veren esiintyminen virtsassa, mikä värjää virtsan vaaleanpunaiseksi tai ruskeaksi, punertavat/mustat ulosteet, veren yskiminen, verta sisältävä tai kahvinpuruja muistuttava oksennus.
- Kaatumisen tai loukkaantumisen yhteydessä, varsinkin jos lyöt pääsi tai lapsesi lyö päänsä, ota kiireellisesti yhteyttä lääkäriin.

- Älä lopeta Dabigatran etexilate Orion -kapselien käyttöä keskustelematta lääkärisi / lastasi hoitavan lääkärin kanssa, jos sinulla/lapsellasi esiintyy närästystä, pahoinvointia, oksentelua, vatsavaivoja, vatsan turvotusta tai ylivatsakipuja.

### TIETOA TERVEYDENHUOLLON AMMATTILAISILLE

- Dabigatran etexilate Orion on suun kautta otettava anti-koagulantti (suora trombiinin estäjä).
- Dabigatran etexilate Orion -valmisteen käyttö on ehkä keskeytettävä ennen kirurgisia tai invasiivisia toimenpiteitä.
- Dabigatran etexilate Orion -valmisteen käyttö on lopetettava välittömästi, jos esiintyy merkittävää verenvuotoa.
- Spesifinen vastalääke (idarusitsumabi) on saatavilla aikuispotilaille. Spesifisen vastalääkkeen, idarusitsumabin, tehoa ja turvallisuutta ei ole varmistettu pediatriisilla potilailla.

**Tarkempia tietoja ja lisäohjeita Dabigatran etexilate Orion -valmisteen antikoagulaatiovaikutuksen kumoamisesta, ks. Dabigatran etexilate Orion -valmisteen ja idarusitsumabin valmisteyhteenvedot.**

- Dabigatran etexilate Orion eliminoituu pääasiassa munuais-ten kautta; riittävää diureesia on ylläpidettävä. Dabigatran etexilate Orion on dialysoitavissa.

### TÄYTÄ TÄMÄ OSIO TAI PYYDÄ LÄÄKÄRIÄSI / LASTASI HOITAVAA LÄÄKÄRIÄ TÄYTTÄMÄÄN SE

#### Potilastiedot

---

Potilaan nimi

---

Syntymäaika

---

Käyttöaihe

---

Dabigatran etexilate Orion -annos