

# PATIENTINFORMATIONSKORT

## Dabigatran etexilate Orion (dabigatraanietexilat)

- Du/vårdaren ska alltid ha med detta patientinformationskort
- Se till att det är den senaste versionen

### BÄSTA PATIENT/VÅRDARE AV EN PEDIATRISK PATIENT,

Du/ditt barn har nu börjat behandlas med Dabigatran etexilate Orion. För att kunna använda Dabigatran etexilate Orion på ett säkert sätt bör du läsa den viktiga informationen i bipacksedeln.

Detta informationskort innehåller viktig information om din/ditt barns behandling. Se därför till att du/ditt barn alltid har med det. Informera vårdpersonal om att du/ditt barn använder Dabigatran etexilate Orion.

### INFORMATION FÖR PATIENTER/VÅRDARE AV PEDIATRISKA PATIENTER

#### Om din/ditt barns behandling

- Dabigatran etexilate Orion tunnar ut blodet. Det används för att behandla befintliga blodproppar eller förhindra att farliga blodproppar bildas.
- Följ din/ditt barns läkares anvisningar när du tar Dabigatran etexilate Orion. Hoppa aldrig över en dos och sluta inte ta/ge Dabigatran etexilate Orion utan att först prata med din/ditt barns läkare.
- Informera din/ditt barns läkare om alla läkemedel som du/ditt barn tar.
- Informera läkaren om att du/ditt barn tar Dabigatran etexilate Orion innan du/ditt barn ska genomgå en operation eller andra ingrepp.
- Dabigatran etexilate Orion kan tas med eller utan mat. Kapseln ska sväljas hel med ett glas vatten. Kapseln får inte brytas sönder eller tuggas och kornen får inte tömmas ut från kapseln.

#### När du bör uppsöka läkare

- Blödningsrisken kan öka när du tar Dabigatran etexilate Orion. Kontakta genast läkare om du/ditt barn upplever tecken och symtom på blödning såsom svullnad, obehag, ovanlig smärta eller huvudvärk, yrsel, blekhet, svaghet, ovanliga blåmärken, näsblod, blödning i tandköttet, ovanligt långvarig blödning vid skärsår, onormalt mensflöde eller blödning från slidan, blod i urinen som kan vara rosa eller brun, röd/svart avföring, blodiga upphostningar, blodiga kräkningar eller kräkningar som liknar kaffesump.
- Vid fall eller skada, framför allt om huvudet skadas, kontakta genast läkare.
- Sluta inte att ta Dabigatran etexilate Orion utan att först prata med din/ditt barns läkare, om du/ditt barn upplever halsbränna, illamående, kräkningar, magbesvär, uppsvälld mage eller smärta i övre delen av buken.

### INFORMATION FÖR VÅRDPERSONAL

- Dabigatran etexilate Orion är ett oralt antikoagulantium (direkt trombinhämmare).
- Behandlingen med Dabigatran etexilate Orion kan behöva avbrytas inför en operation eller annat ingrepp.
- Om större blödningshändelser uppstår måste behandlingen med Dabigatran etexilate Orion avbrytas omedelbart.
- Ett specifikt reverserande läkemedel (idarucizumab) finns tillgängligt för vuxna patienter. Effekt och säkerhet för det specifika reverserande läkemedlet, idarucizumab, har inte fastställts hos pediatrika patienter.

För mer information och ytterligare råd om hur den antikoagulerande effekten av Dabigatran etexilate Orion kan motverkas se produktresumén för Dabigatran etexilate Orion och idarucizumab.

- Dabigatran etexilate Orion utsöndras huvudsakligen via njurarna; adekvat diures måste upprätthållas. Dabigatran etexilate Orion kan dialyseras.

### FYLL I DENNA DEL ELLER BE DIN/DITT BARN'S LÄKARE ATT GÖRA DET

#### Patientinformation

---

Patientens namn

---

Födelsedatum

---

Indikation för antikoagulation

---

Dabigatran etexilate Orion dos