

Potilaskortti

Sivu 1

Keuhkovaltimoiden verenpainetaudin hoitoon.

Tässä kortissa on tärkeitä turvallisuutta koskevia tietoja, joista sinun on oltava tietoinen Yuvanci-hoitoa saadessasi. Pidä tämä kortti aina mukanas ja näytä sitä kaikille hoitoosi osallistuville lääkäreille.

Yuvanci® 10 mg/20 mg
Yuvanci® 10 mg/40 mg
masitentaani/tadalafili
kalvopäällysteiset tabletit

FI

Sivu 2

On tärkeää, että ilmoitat lääkkeen määränneelle lääkärille välittömästi, jos tulet raskaaksi, sekä kaikista Yuvanci-hoidon aikana mahdollisesti ilmenevistä haittavaikutuksista.

Hoitoyksikkö:

Lääkkeen määränneen lääkärin nimi:

Lääkkeen määränneen lääkärin puhelinnumero:

Sivu 3

Raskaus
Yuvanci voi haitata sikiön kehitystä. Siksi et saa käyttää Yuvanci-valmistetta, jos olet raskaana. Et myöskään saa tulla raskaaksi Yuvanci-hoidon aikana. Lisäksi jos sairastat keuhkovaltimoiden verenpainetautia, raskaus voi pahentaa sairautesi oireita vaikea-asteisesti.

Sivu 4

Ehkäisy

Sinun on käytettävä Yuvanci-hoidon aikana luotettavaa ehkäisyä. Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin puoleen.

Sinun pitää tehdä raskaustesti ennen Yuvanci-hoidon aloittamista ja joka kuukausi hoidon aikana, vaikka et omasta mielestäsi olisikaan raskaana.

Sivu 5

Yuvanci voi muiden samaan lääkeryhmään kuuluvien lääkkeiden tavoin vaikuttaa maksaan. Lääkäri ottaa verikokeen ennen Yuvanci-hoidon aloittamista sekä hoidon aikana selvittääkseen, toimiiko maksasi kunnolla.

Mahdollisia merkkejä siitä, että maksasi ei toimi kunnolla, ovat

- pahoinvointi
- oksentelu
- kuume
- mahakipu (vatsakipu)
- keltaisuus (ihon ja silmänvalkuaisten muuttuminen keltaiseksi)
- tumma virtsa
- ihon kutina
- apaattisuus tai uupumus (poikkeava väsymys tai voimattomuus)
- flunssan kaltainen oireyhtymä (nivel- ja lihaskipu, johon liittyy kuumetta).

Sivu 6

Jos havaitset näitä oireita, kerro siitä välittömästi lääkärille. Jos sinulla on kysyttävää hoidostasi, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.