1.

POTILASKORTTI

UPLIZNA®

(inebilitsumabi)

▼ Tähän lääkevalmisteeseen kohdistuu lisäseuranta. Tällä tavalla voidaan havaita nopeasti turvallisuutta koskevaa uutta tietoa. Voit auttaa ilmoittamalla kaikista mahdollisesti saamistasi haittavaikutuksista. Ks. kortin lopusta, miten haittavaikutuksista ilmoitetaan.

Tämä potilaskortti täyttää myyntiluvan ehdot ja on Fimean hyväksymä.

Uplizna Patient Card, Finnish
Versio 2.0 (EU v3) Hyväksytty: tammikuussa 2026

2.

Terveydenhuollon ammattilaiset:

Potilaan nimi

saa Uplizna-hoitoa

3.

UPLIZNA VOI AIHEUTTAA VAKAVIA HAITTAVAIKUTUKSIA

Kiinnitä huomiota seuraaviin merkkeihin ja oireisiin, jotta infektiot voidaan havaita varhaisessa vaiheessa:

- Infektiot, mukaan lukien vakavat infektiot
- Virusten uudelleenaktivoituminen
- Opportunistiset infektiot
- Progressiivinen multifokaalinen leukoenkefalopatia (PML)

4.

UPLIZNA-VALMISTEEN MERKITTÄVIÄ MAHDOLLISIA HAITTAVAIKUTUKSIA

Infektioriski kasvaa.
Vaikeita tai epätavallisia infektioita voi esiintyä.

5.

Kerro lääkärille, jos sinulla ilmenee esimerkiksi seuraavia infektion oireita:

- Nenän tukkoisuus tai vuotaminen
- Kurkkukipu tai yskä
- Punaiset, kivuliaat rakkulat iholla
- Kipu virtsatessa ja tihentynyt virtsaamistarve
- Hengenahdistus
- Polttava tunne, puutuminen tai kihelmöinti
- Uneliaisuus
- Koko vartalon kipu
- Kuume tai vilunväristykset
- Pistävä kipu

6.

Virusinfektiot, joita sinulla on ollut aiemmin, voivat aktivoitua uudelleen. Näin voi käydä, jos immuunijärjestelmä on heikentynyt. Yksi esimerkki vakavasta infektiosta on hepatiitti, joka on maksan infektio. Sinulle tehdään hepatiittikoe ennen jokaista hoitokertaa. Kerro lääkärille heti, jos sinulla ilmenee infektion oireita.

Progressiivinen multifokaalinen leukoenkefalopatia (PML) on harvinainen aivojen infektio. PML saattaa johtaa kuolemaan tai vakavaan vammaan. Sen oireet voivat olla aluksi lieviä. Infektio voi kuitenkin pahentua joidenkin päivien tai viikkojen aikana.

7.

PML:n oireita ovat:

- Heikkous kehon toisella puolella
- Näkömuutokset
- Sekavuus
- Käsien ja jalkojen kömpelyys
- Ajattelun, muistin tai persoonallisuuden muutokset
- Uudet ilmenevät kohtaukset

Jos sinulla ilmenee jokin näistä oireista, hakeudu välittömästi lääkäriin.

8.

Pidä tämä kortti aina mukanasi.

Kaikkia mahdollisia haittavaikutuksia ei ole lueteltu tässä potilaskortissa. Katso Uplizna-valmisteen pakkausseloste Lääkeinfo.fi-sivustolta tai pyydä se Amgenin lääketietoasiantuntijalta, puh. (09) 54 900 500, sähköposti medinfo.finland@amgen.com.

9.

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä terveydenhuollon ammattilaiselle. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan osoitteeseen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea, Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri, PL 55, 00034 FIMEA (www-sivusto: www.fimea.fi). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

10.

Jos sinulla ilmenee infektion tai PML:n oireita, **ota yhteys lääkäriin:**

Nimi

Puhelinnumero

Terveydenhuoltoyksikkö