

PATIENTKORT

UPLIZNA® (inebilizumab)

▼ Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning antingen till Fimea: www.fimea.fi eller till Amgen: nordic.baltic.drugsafety@amgen.com.

Uplizna Patient Card, Finland, Swedish
Version 1.0 Godkänd: september 2024

UPLIZNA är ett läkemedel för behandling av vuxna med neuromyelitis optica-spektrumtillstånd (NMOSD) som är positiva för antikroppar mot aquaporin-4 (AQP4). Vid NMOSD angriper immunsystemet friska delar av centrala nervsystemet (CNS). Dessa skov orsakar en inflammation i CNS. De delar av CNS som oftast drabbas är synnerven, ryggmärgen, hjärnan och hjärnstammen. UPLIZNA är en antikropp riktad mot B-celler som angriper CNS. Genom att näst intill eliminera B-celler minskar inflammationen och sannolikheten för skov.

VIKTIGA BIVERKNINGAR AV UPLIZNA

Risken för infektioner ökar.
Svåra eller ovanliga infektioner kan förekomma.

Virusinfektioner som du har haft tidigare kan reaktiveras. Detta kan hända om immunsystemet försvagas. Ett exempel på en allvarlig infektion är hepatit, en infektion i levern. Ett hepatittest kommer att göras innan varje behandling påbörjas. Tala genast om för din läkare om du får några symtom på en infektion.

Progressiv multifokal leukoencefalopati (PML) är en sällsynt infektion i hjärnan. PML kan leda till döden eller svår funktionsnedsättning. Infektionen kan börja med lindriga symtom. Men den kan förvärras på några dagar eller veckor.

Ha alltid med dig det här kortet.

Om du får biverkningar, tala med hälso- och sjukvårdspersonalen. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea, Biverkningsregistret, PB 55, 00034 Fimea, (webbplats: www.fimea.fi). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedlets säkerhet. Du kan få mer information från: Uplizna bipacksedel (Lääkeinfo.fi) och Amgens medicinsk information på tel: (09) 54 900 500, e-post medinfo.finland@amgen.com

Hälso- och sjukvårdspersonal:

Patientens namn

får UPLIZNA för NMOSD.

UPLIZNA KAN ORSAKA ALLVARLIGA BIVERKNINGAR.

Var uppmärksam på tecken och symtom för att tidigt upptäcka infektioner:

- Svår infektion
- Reaktivering av virus
- Opportunistisk infektion
- Progressiv multifokal leukoencefalopati (PML)

Till symtomen på NMOSD-skov hör:

- Synförändringar
- Svårigheter att kontrollera blåsa och tarm
- Svaghet i armar och ben
- Kraftigt illamående, kräkningar eller hicka
- Muskelkramper eller annan smärta

CNS kan skadas genom upprepade skov (även kallade episoder). Dessa skov kan orsaka svåra och permanenta funktionsnedsättningar, inklusive förlamning och blindhet. NMOSD kan även försämra andningen och leda till döden.

Tala om för din läkare om du får symtom på en infektion, t.ex.:

- Töppt eller rinnig näsa
- Ont i halsen eller hosta
- Röda, smärtsamma utslag eller blåsor på huden
- Smärtsamma och täta blåstömningar
- Andfåddhet
- Brännande känsla, domningar eller stickningar
- Sömnighet
- Värk i kroppen
- Feber eller frossa
- Huggande smärta

Symtom på PML är:

- Svaghet i ena sidan av kroppen
- Synförändringar
- Förvirring
- Tunga armar och ben
- Förändringar i tankeförmågan, minnet eller personligheten
- Nyttillkomna krampanfall

Sök omedelbart vård om du får något av dessa symtom.

Kontakta din läkare om du får symtom på en infektion eller PML.

Namn

Telefonnummer

Klinik