1.

PATIENTKORT

UPLIZNA®

(inebilizumab)

▼ Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation. Du kan hjälpa till genom att rapportera de biverkningar du eventuellt får. Information om hur du rapporterar biverkningar finns i slutet av kortet.

Detta patientkort uppfyller villkoren för försäljningstillståndet och är godkänt av Fimea.

Uplizna Patient Card, Finland, Swedish
Version 2.0 (EU v3) Godkänd: januari 2026

2.

Hälso- och sjukvårdspersonal:

Patientens namn

får UPLIZNA

3.

UPLIZNA KAN ORSAKA ALLVARLIGA BIVERKNINGAR

Var uppmärksam på tecken och symtom för att tidigt upptäcka infektioner:

- Infektioner, inklusive allvarliga infektioner
- Reaktivering av virus
- Opportunistiska infektioner
- Progressiv multifokal leukoencefalopati (PML)

4.

VIKTIGA BIVERKNINGAR AV UPLIZNA

Risken för infektioner ökar.
Svåra eller ovanliga infektioner kan förekomma.

5.

Tala om för din läkare om du får symtom på en infektion, t.ex.:

- Täppt eller rinnig näsa
- Ont i halsen eller hosta
- Röda, smärtsamma blåsor på huden
- Smärtsamma och täta blåstömningar
- Andfåddhet
- Brännande känsla, domningar eller stickningar
- Sömnighet
- Värk i kroppen
- Feber eller frossa
- Huggande smärta

6.

Virusinfektioner som du har haft tidigare kan reaktiveras. Detta kan hända om immunsystemet försvagas. Ett exempel på en allvarlig infektion är hepatit, en infektion i levern. Ett hepatittest kommer att göras innan varje behandling påbörjas. Tala genast om för din läkare om du får några symtom på en infektion.

Progressiv multifokal leukoencefalopati (PML) är en sällsynt infektion i hjärnan. PML kan leda till döden eller svår funktionsnedsättning. Infektionen kan börja med lindriga symtom. Men den kan förvärras på några dagar eller veckor.

7.

Symtom på PML är:

- Svaghet i ena sidan av kroppen
- Synförändringar
- Förvirring
- Tunga armar och ben
- Förändringar i tankeförmågan, minnet eller personligheten
- Nytillkomna krampanfall

Sök vård omedelbart om du får något av dessa symtom.

8.

Ha alltid med dig det här kortet.

Alla möjliga biverkningar anges inte på detta patientkort. Se bipacksedeln för Uplizna på webbplatsen Lääkeinfo.fi eller be om den från Amgens avdelning för medisinsk information på tel: (09) 54 900 500, e-post medinfo.finland@amgen.com.

9.

Om du får biverkningar, tala med hälso- och sjukvårdspersonalen. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea, Biverkningsregistret, PB 55, 00034 Fimea, (webbplats: www.fimea.fi). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedlets säkerhet.

10.

Kontakta din läkare om du får symtom på en infektion eller PML.

Namn

Telefonnummer

Klinik