

Tietoa terveydenhuollon ammattilaisille:

- INR-mittausta ei tule käyttää, koska se ei kuvaa Rivaroxaban Stada -valmisteen antikoagulanttivaikutusta luotettavasti.

Mitä minun tulisi tietää Rivaroxaban Stada -valmisteesta?

- Rivaroxaban Stada ohentaa verta ja estää siten vaarallisten veritulppien muodostumisen.
- Ota Rivaroxaban Stada -valmistetta juuri sen verran kuin lääkäri on määrännyt. Parhaan suojan veritulppia vastaan saat, kun **otat sinulle määrätty annokset säännöllisesti.**

- Älä lopeta Rivaroxaban Stada -valmisteen ottamista keskustelematta ensin lääkärin kanssa, sillä lopettaminen saattaa lisätä veritulpan riskiä.
- Ennen kuin aloitat ottamaan Rivaroxaban Stada -valmistetta, kerro lääkärille kaikista muista lääkevalmisteista, joita parhaillaan otat, olet äskettäin ottanut tai aiot alkaa ottaa.
- Kerro aina, että käytät Rivaroxaban Stada -valmistetta ennen kuin sinulle tehdään kirurginen tai muu toimenpide.

Milloin tarvitsen lääkärin apua?

Rivaroxaban Stada -valmisteen kaltaista verenohennuslääkettä käytettäessä on

tärkeää olla tietoinen sen mahdollisista haittavaikutuksista. Yleisin haittavaikutus on verenvuoto. Jos tiedät, että sinulla on verenvuotoriski, älä aloita ottamaan Rivaroxaban Stada -valmistetta keskustelematta asiasta ensin lääkärin kanssa. Kerro välittömästi lääkärille, jos sinulla ilmenee jotain seuraavista verenvuodon merkeistä tai oireista:

- kipua
- turvotusta tai epämukavuutta
- päänsärkyä, huimausta tai heikotusta
- epänormaalia mustelmien muodostumista, nenä- tai ienverenvuotoa tai jos verenvuodon tyrehtyminen kestää poikkeuksellisen kauan
- tavallista runsaampaa kuukautisvuotoa

- toa tai muuta verenvuotoa emättimestä
- virtsassasi on verta ja se voi olla vaaleanpunaista tai ruskeaa taikka ulosteesi ovat punaisia tai mustia
- yskit verta tai oksennat verta tai kahvinporoja muistuttavia hiukkasia.

Miten otan Rivaroxaban Stada -valmistetta?

- Parhaan suojan saamiseksi, Rivaroxaban Stada
 - 2,5 mg voidaan ottaa ruoan kanssa tai ilman
 - 10 mg voidaan ottaa ruoan kanssa tai ilman
 - 15 mg tulee ottaa ruoan kanssa
 - 20 mg tulee ottaa ruoan kanssa

POTILASKORTTI

[Rivaroxaban STADA tabletit
2,5 mg / 10 mg /
15 mg / 20 mg / hoidon
aloituspakkaus]

1370905

POTILASKORTTI

Rivaroxaban STADA 2,5 mg
(merkitse määrätty annos
rastittamalla ruutu)

Rivaroxaban STADA 10 mg
(merkitse määrätty annos
rastittamalla ruutu)

Rivaroxaban STADA 15 mg
(merkitse määrätty annos
rastittamalla ruutu)

Rivaroxaban STADA 20 mg
(merkitse määrätty annos
rastittamalla ruutu)

- Pidä tämä kortti aina mukanas
- Näytä tämä kortti aina lääkärille tai hammaslääkärille ennen hoitotoimenpidettä

Käytän verenohennuslääkettä, joka on Rivaroxaban Stada (rivaroksabaani).

Nimi:

Osoite:

Syntymäaika:

Paino:

Muut lääkkeet/sairaudet:

Hätätapauksissa ilmoittakaa:

Lääkärin nimi:

Lääkärin puhelin:

Lääkärin leima:

Ilmoittakaa myös:

Nimi:

Puhelin:

Suhde potilaaseen:

Information för vårdpersonal:

- INR-test ska inte användas eftersom det inte är ett tillförlitligt mått på den antikoagulatoriska aktiviteten hos Rivaroxaban Stada.

Vad bör jag veta om Rivaroxaban Stada?

- Rivaroxaban Stada gör blodet tunnare, vilket förhindrar bildning av farliga blodproppar.
- Rivaroxaban Stada måste tas exakt så som din läkare ordinerat. För att få ett optimalt skydd mot blodproppar ska du **aldrig hoppa över en dos**.
- Du ska inte sluta ta Rivaroxaban Stada utan att först tala med din läkare,

eftersom risken för blodproppar kan öka.

- Tala om för din vårdpersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel, innan du påbörjar behandling med Rivaroxaban Stada.
- Tala om för din vårdpersonal att du tar Rivaroxaban Stada innan kirurgi eller andra ingrepp.

När ska jag be om råd från min läkare?

När man tar blodförtunnande medel som Rivaroxaban Stada är det viktigt att känna till eventuella biverkningar. Blödningar är den vanligaste biverkningen. Påbörja inte behandling med Rivaroxaban Stada om du vet att du har risk för blödningar, utan att

först diskutera detta med din läkare. Tala genast om för din läkare om du har fått några tecken eller symtom på blödning enligt nedan:

- smärta
- svullnad eller obehag
- huvudvärk, yrsel eller svaghet
- ovanligt många blåmärken, näsblödning, blödningar från tandköttet eller från sår som tar lång tid att sluta blöda
- menstruation eller vaginal blödning som är kraftigare än normalt
- blod i urinen som kan vara rosa- eller brunfärgad, röd eller svart avföring
- upphostningar med blod, eller kräkningar med blod eller kaffesumpsliknande kräkningar.

Hur ska jag ta Rivaroxaban Stada?

- För att få ett optimalt skydd, ska Rivaroxaban Stada
 - 2,5 mg tas med eller utan mat
 - 10 mg tas med eller utan mat
 - 15 mg tas med mat
 - 20 mg tas med mat

PATIENTKORT

**[Rivaroxaban STADA
tabletter 2,5 mg / 10 mg
/ 15 mg / 20 mg /
startförpackning]**

1370905

PATIENTKORT

Rivaroxaban Stada 2,5 mg
(kryssruta för ikryssning av
förskrivn dos)

Rivaroxaban Stada 10 mg
(kryssruta för ikryssning av
förskrivn dos)

Rivaroxaban Stada 15 mg
(kryssruta för ikryssning av
förskrivn dos)

Rivaroxaban Stada 20 mg
(kryssruta för ikryssning av
förskrivn dos)

- Bär alltid detta kort med dig
- Ta fram kortet varje gång du söker
behandling hos läkare eller tandläkare

**Jag får antikoagulationsbehandling med
Rivaroxaban Stada (rivaroxaban).**

Namn:

Adress:

Födelsedatum:

Vikt:

Andra läkemedel / medicinska tillstånd:

I akuta situationer, vänligen kontakta:

Läkarens namn:

Läkarens telefonnummer:

Läkarens stämpel:

Vänligen kontakta också:

Namn:

Telefonnummer:

Relation:
