

# NorLevo®

1,5 mg tabletti / Levonorgestreeli

NorLevo® 1,5 mg tabletti/tablett  
Levonorgestrel

Vnr 02 54 91

1  
tabl.

## AMMATTILAISEN TASKUKORTTI

## NorLevo® Jälkiehkäisyvalmiste

1  
tabl.

**NorLevo® on lisäinformaatiota vaativa itsehoitolääke.  
Se soveltuu hedelmällisessä iässä oleville naisille,  
mukaan lukien nuoret.**

### Annostus

Yksi tabletti suun kautta mahdollisimman pian, mieluiten 12 tunnin, mutta viimeistään 3 vuorokauden (72 tunnin) kuluessa suojaamattoman yhdynnän tai ehkäisymenetelmän pettämisen jälkeen. Valmisteen teho on sitä parempi, mitä nopeammin tabletti otetaan. Tehoa ei tunneta, kun valmiste otetaan yli 72 tuntia yhdynnästä.

Jos oksentaa kolmen tunnin kuluessa tabletin ottamisen jälkeen, tulee ottaa toinen tabletti mahdollisimman pian.

Jos on käyttänyt edeltävien 4 viikon aikana entsyymitoimintaa indusoivia lääkkeitä ja tarvitsee jälkiehkäisyä, on suositeltavaa käyttää hormonitonta jälkiehkäisyä eli kupari-kerukkaa. Mikäli nainen ei voi tai ei halua käyttää kuparikierukkaa, hänen tulee ottaa kaksinkertainen annos NorLevoa, toisin sanoen 2 tablettia kerralla.

### Kehota ottamaan NorLevo mahdollisimman pian

NorLevo estää tai viivästyttää ovulaatiota estämällä luteinisoivan hormonin (LH) erityksen huipun. Jos luteinisoivan hormonin erityksen kasvu on jo alkanut, ei levonorgestrelillä ole enää jälkiehkäisytehoa. Ovulaation ajankohtaa kuukautiskierrossa ei voi tarkkaan ennustaa, ja siksi jälkiehkäisytabletti tulisi aina ottaa mahdollisimman pian suojaamattoman yhdynnän jälkeen.

### Hyvin yleiset haittavaikutukset

Huimaus, päänsärky, pahoinvointi, vatsakipu, rintojen arkuus, kuukautisten viivästyminen, runsaat kuukautiset, verinen vuoto ja väsymys. Haittavaikutukset häviävät yleensä 48 tunnin kuluessa NorLevo-valmisteen ottamisesta.

Perrigo Suomi Oy  
Puh: 020 763 1600  
finlandinfo@perrigo.com

Tilaa materiaalit osoitteesta:  
<https://extranet.velox.fi>  
Kirjautumiseen tarvittava tunnus  
ja salasana on **acoapteekki**

# Jotta jälkiekhäisy onnistuisi, käy asiakkaan kanssa läpi seuraavat asiat:

1. NorLevo-valmistetta ei suositella:
  - jos on jo ottanut ulipristaaliasetaattia sisältävän lääkkeen (esim. ellaOne).
  - jos on vaikea maksan vajaatoiminta.
  - jos on ollut kohdun ulkoinen raskaus.
  - jos naisella tai hänen perheenjäsenellä on ollut verisuonitukoksen riskitekijöitä.
  - tiettyjen lääkeaineiden tai rohdosten kanssa. Tällaisia ovat barbituraatit ja muut epilepsian hoitoon käytettävät lääkkeet (esim. primidoni, fenytoiini ja karbamatepiini), tuberkuloosilääkkeet (esim. rifampisiini, rifabutiini), HIV-lääkkeet (ritonaviiri, efavirentsi), eräs sienilääke (griseofulviini) sekä mäkikuismaa (*Hypericum perforatum*) sisältävät rohdosvalmisteet.
  - **Vasta-aiheet:** Yliherkkyys levonorgestreelille tai jollekin muulle tämän valmisteeseen sisältämälle aineelle
2. Vaikeat imeytymishäiriöt, kuten Crohnin tauti voivat heikentää NorLevo-valmisteen tehoa.
3. Pyydä asiakasta lukemaan NorLevo-valmisteen pakkausseloste.
4. Kerro, että NorLevo-tabletti on otettava heti.
5. Imettäminen on mahdollista, mutta sitä ei suositella 8 tuntiin tabletin ottamisen jälkeen. Imettäminen tulisi tehdä juuri ennen tabletin ottamista ja seuraavan kerran aikaisintaan 8 tunnin varoajan jälkeen.
6. Luotettavaa ehkäisymenetelmää tulee käyttää seuraavien yhdyntöjen aikana seuraaviin kuukautisiin saakka.
7. Normaali kuukautiset ovat merkki siitä, että jälkiekhäisy on todennäköisesti toiminut. Jos kuukautiset ovat yli 5 päivää myöhässä, on syytä tehdä raskaus-testi. Jos asiakas on raskaana, tulee hänen ottaa yhteyttä lääkäriin tai neuvolaan.
8. Kehota asiakasta kääntymään lääkärin puoleen keskustelemaan hänelle sopivasta säännöllisestä ehkäisymenetelmästä.

**Tuotetieto:** NorLevo® 1,5 mg tabletti

**Vaikuttava aine:** levonorgestreeli. **Käyttöaika:** Raskauden jälkiekhäisy 72 tunnin kuluessa yhdynnästä, jossa ei ole käytetty ehkäisyä tai jos ehkäisy on pettänyt. **Annustus ja antotapa:** 1 tabletti kerta-annoksena suun kautta niin pian kuin mahdollista, mieluiten 12 tunnin kuluessa ja enintään 72 tunnin kuluessa suojaamattomasta yhdynnästä. Ks. tarkemmat annostusohjeet valmisteyhteenvedosta. **Vasta-aiheet:** Yliherkkyys vaikuttavalle aineelle tai apuaineille. **Varoitukset ja käyttöön liittyvät varoitukset:** Jälkiekhäisy on tarkoitettu ainoastaan tilapäiseen käyttöön, eikä se estä raskautta kaikissa tapauksissa. Ei suositella potilaille, joilla on kohdunulkoinen raskauden riski tai vaikea maksan vajaatoiminta. Erityistä varovaisuutta on noudattava naisilla, joilla on vaikea imeytymishäiriö tai aikaisempia tromboembolisia riskitekijöitä. Ei pidä käyttää toistuvasti saman kuukautiskierron aikana. Lääkärissä käyntiä suositellaan säännöllisen ehkäisyn aloittamiseksi tai käytetyn ehkäisyn muuttamiseksi ja raskauden mahdollisuus tulee tarvittaessa sulkea pois. NorLevo ei korvaa sukupuolitautilien ehkäisyn käytettäviä varotoimia. **Yhteisvaikutukset:** Maksan entsyymien, lähinnä CYP3A4-entsyymien, induktorit pienentävät levonorgestreelipitoisuuksia. Ulipristaaliasetaattia sisältäviä valmisteita ei suositella samanaikaisesti ja siklosporiinin toksisuusriski suurenee yhteiskäytössä levonorgestreelin kanssa. **Hedelmällisyys, raskaus ja imetys:** Hedelmällisyyden nopea palautuminen on todennäköistä. Valmiste ei keskeytä alkanutta raskautta. Imetystä suositellaan juuri ennen valmisteeseen ottamista tai aikaisintaan 8 tuntia sen ottamisen jälkeen. **Vaikutus ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn:** Jos väsymystä tai huimausta ilmenee, ajaminen ja koneiden käyttö ei ole suositeltavaa. **Haittavaikutukset:** Hyvin yleinen: huimaus, päänsärky, pahoinvointi, vatsakipu, kohtaukkipu, rintojen arkuus, kuukautisten viivästyminen, runsaat kuukautiset, verinen vuoto, väsymys. **Yleinen:** ripuli, oksentelu, kuukautiskivut. Ks. tarkemmat tiedot valmisteyhteenvedosta. **Pakkaukset ja hinnat (01.01.2023):** 1 tabl. 16,91 €. **Korvattavuus:** Ei SV-korvattava. Itsehoitolääke. **Markkinointi:** Perrigo Sverige AB, puh: 020 763 1600, finlandinfo@perrigo.com. **Tutustu valmisteyhteenvedoon ennen lääkkeen määräämistä.** Perustuu 10.9.2021 päivättyyn valmisteyhteenvedoon.