

# NorLevo®

1,5 mg tablett / Levonorgestrel

NorLevo® 1,5 mg tabletti/tablett  
Levonorgestrel

Vir 02 54 91

1  
tabl.

FICKKORT FÖR VÅRDPERSONAL

## NorLevo® Akut preventivmedel

1  
tabl.

**NorLevo® är ett receptfritt läkemedel som kräver extra rådgivning. NorLevo kan användas av kvinnor i fertil ålder, inklusive ungdomar.**

### Dosering

En tablett via munnen så snart som möjligt, helst inom 12 timmar men inte senare än 3 dygn (72 timmar) efter oskyddat samlag eller om en preventivmetod inte har fungerat. Ju tidigare tabletten tas, desto bättre är effekten. Effekten är okänd om produkten tas senare än 72 timmar efter samlaget.

Om kvinnan kräks inom tre timmar efter att ha tagit tabletten, ska hon så snart som möjligt ta en ny tablett.

För kvinnor som har använt enzyminducerande läkemedel under de senaste 4 veckorna och behöver ett akut preventivmedel rekommenderas användning av ett icke-hormonellt akut preventivmedel, dvs. kopparspiral. Kvinnor som inte kan eller vill använda kopparspiral ska ta en dubbel dos NorLevo, dvs. 2 tabletter på samma gång.

### Uppmana kvinnan att ta NorLevo så snart som möjligt

NorLevo hämmar eller förskjuter ägglossning genom att förhindra toppen av utsöndringen av luteiniserande hormon (LH). Om utsöndringen av luteiniserande hormon redan har börjat tillta har levonorgestrel inte mera någon effekt som akut preventivmetod. Det går inte att exakt förutsäga tidpunkten för ägglossning under en menstruationscykel, därför bör akut p-piller alltid tas så snart som möjligt efter oskyddat samlag.

### Mycket vanliga biverkningar

Yrsel, huvudvärk, illamående, magsmärta, smärta i livmodern, ömhet i bröstet, försenad menstruation, kraftig menstruation, blödning och trötthet. Biverkningarna går vanligtvis över inom 48 timmar efter att NorLevo tagits.

Perrigo Suomi Oy  
Tel: 020 763 1600  
finlandinfo@perrigo.com

Beställ material från adressen:  
<https://extranet.velox.fi>  
Användarkoden och lösenordet  
för att logga in är *acoapteekki*

## Gå igenom följande med kunden för att säkerställa att användningen av akut preventivmedel fungerar:

1. Användning av NorLevo rekommenderas inte:
  - Om kvinnan redan tagit läkemedel som innehåller ulipristalacetat (t.ex. ellaOne)
  - Vid svår leversvikt
  - Om kvinnan tidigare haft utomkvedshavandeskap
  - Om kvinnan eller någon i hennes familj har haft riskfaktorer för trombos
  - Med vissa läkemedel och växtbaserade läkemedel. Dessa innefattar barbiturater och andra läkemedel mot epilepsi (t.ex. primidon, fenytoin och karbamazepin), läkemedel mot tuberkulos (t.ex. rifampicin, rifabutin), läkemedel för behandling av HIV-infektion (ritonavir, efavirenz), ett visst läkemedel mot svampinfektioner (griseofulvin) samt växtbaserade läkemedel som innehåller Johannesört (*Hypericum perforatum*).
  - **Kontraindikationer:** Överkänslighet mot levonorgestrel eller något annat innehållsämne i detta läkemedel
2. Svåra malabsorptionssyndrom, t.ex. Crohns sjukdom, kan försvaga effekten av NorLevo.
3. Uppmana kunden att läsa bipacksedeln för NorLevo.
4. Berätta att NorLevo-tabletten ska tas omedelbart.
5. Kvinnan kan amma, men amning rekommenderas inte inom 8 timmar efter att tabletten tagits. Kvinnan bör därför amma omedelbart innan hon tar tabletten och amma följande gång tidigast efter 8 timmar.
6. En tillförlitlig preventivmetod ska användas vid följande samlag fram till nästa menstruation.
7. Normal menstruation är tecken på att användningen av akut preventivmedel sannolikt har fungerat. Om menstruationen är mer än 5 dagar försenad ska man göra ett graviditetstest. Om kunden är gravid ska hon ta kontakt med läkare eller rådgivningen.
8. Uppmana kunden att kontakta läkare för att diskutera en lämplig, regelbunden preventivmetod.

**NorLevo® 1,5 mg tablett, levonorgestrel. Terapeutisk indikation:** Postkoital antikonception för användning inom 72 timmar efter oskyddat samlag eller efter att någon preventivmetod misslyckats. **Dosering och administreringsätt:** 1 tablett som engångsdos via munnen så snart som möjligt, helst inom 12 timmar och inte senare än 72 timmar efter oskyddat samlag. Se produktresumén för ytterligare information om dosering. **Kontraindikationer:** Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne. **Varningar och försiktighet:** Postkoital antikonception är en tillfällig metod och förhindrar inte alltid graviditet. Rekommenderas inte till patienter som löper risk för utomkvedshavandeskap eller har svår leversvikt. Särskild försiktighet ska iakttas vid svårt malabsorptionssyndrom eller tidigare riskfaktorer för tromboemboli. Ska inte användas mer än en gång inom samma menstruationscykel. Läkarsbesök rekommenderas för initiering av regelbunden preventivmetod eller anpassning av nuvarande preventivmetod, eventuellt graviditet ska vid behov uteslutas. NorLevo ersätter inte försiktighetsåtgärder mot sexuellt överförbara sjukdomar. **Interaktioner:** Leverenzyminducерande medel, främst CYP3A4 enzyminducерare, minskar koncentrationen av levonorgestrel. Samtidig användning av läkemedel som innehåller ulipristalacetat rekommenderas inte, och samtidig användning av levonorgestrel och ciklosporin ökar risken för ciklosporintoxicitet. **Fertilitet, graviditet och amning:** Snabb återgång till fertilitet är sannolik. Produkten avbryter inte en påbörjad graviditet. Amning rekommenderas omedelbart innan produkten tas och tidigast 8 timmar efter det. **Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner:** Om trötthet eller yrsel förekommer bör man inte framföra fordon eller använda maskiner. **Biverkningar:** Mycket vanliga: yrsel, huvudvärk, illamående, magsmärta, smärta i livmodern, ömhet i bröstet, försenad menstruation, kraftig menstruation, blödning, trötthet. **Vanliga:** diarré, kräkningar, smärtsamma menstruationer. Se produktresumén för ytterligare information. **Förpackningar och priser (01.01.2023):** 1 tabl. 16,91 €. **Ersättningsstatus:** Ingen sjukförsäkringsersättning. Receptfritt läkemedel. **Marknadsföres:** Perrigo Sverige AB, tel: 020 763 1600, finlandinfo@perrigo.com. **Läs produktresumén före förskrivning.** *Texten baserar sig på produktresumén daterad 10.9.2021.*