

POTILASKORTTI

Welireg ▼ (beltsutifaani)

- Älä ota WELIREG-valmistetta von Hippel–Lindaun taudin hoitoon, jos olet raskaana.
- Jos olet raskaana ja tarvitset hoitoa munuaiskarsinooman vuoksi, keskustele lääkärin kanssa WELIREG-valmisteen käytöstä.
- WELIREG saattaa vahingoittaa lasta ja aiheuttaa keskenmenon. Jos olet raskaana, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.
- Lääkäri pyytää sinua tekemään raskaustestin ennen kuin aloitat WELIREG-valmisteen käytön.
- WELIREG-valmisteen käytön aikana ei saa tulla raskaaksi.

Raskauden ehkäisy

- Jos olet nainen ja voit tulla raskaaksi:
 - hormoneja sisältävät ehkäisyvalmisteet – kuten ehkäisytabletit, -pistokset tai -laastarit – eivät välttämättä tehoa tavanomaiseen tapaan WELIREG-hoidon aikana
 - sinun tulee WELIREG-hoidon aikana ja vähintään 1 viikon ajan viimeisen annoksen ottamisen jälkeen
 - käyttää tehokasta, hormonitonta ehkäisyä tai
 - varmistaa, että miespuolinen kumppanisi käyttää kondomia.
- Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa siitä, mitkä ehkäisymenetelmät voisivat sopia sinulle WELIREG-hoidon aikana.
- Kerro lääkärille heti, jos tulet raskaaksi tai epäilet olevasi raskaana hoidon aikana.

Lisätietoa löytyy potilaille tarkoitetusta WELIREG-valmisteen pakkausselosteesta.

Tärkeät yhteystiedot

Lääkärin nimi _____
Puhelinnumero virka-aikaan _____
Puhelinnumero virka-ajan jälkeen _____
Oma nimi _____

